

Thermal blurring of a coherent Fermi gas

Hadrien Kurkjian, Yvan Castin, Alice Sinatra

Laboratoire Kastler Brossel, ENS-PSL, CNRS, UPMC-Sorbonne Universités et Collège de France, Paris, France

Abstract

It is generally assumed that a condensate of paired fermions at equilibrium is characterized by a macroscopic wavefunction with a well-defined, immutable phase. In reality, all systems have a finite size and are prepared at non-zero temperature; the condensate has then a finite coherence time, even when the system is isolated in its evolution and the particle number N is fixed. The loss of phase memory is due to interactions of the condensate with the excited modes that constitute a dephasing environment. This fundamental effect, crucial for applications using the condensate of pairs' macroscopic coherence, was scarcely studied. We link the coherence time to the condensate phase dynamics, and we show with a microscopic theory that the time derivative of the condensate phase operator $\hat{\theta}_0$ is proportional to a chemical potential operator that we construct including both the pair-breaking and pair-motion excitation branches. In a single realization of energy E , $\hat{\theta}_0$ evolves at long times as $-2\mu_{\text{mc}}(E)t/\hbar$ where $\mu_{\text{mc}}(E)$ is the microcanonical chemical potential; energy fluctuations from one realization to the other then lead to a ballistic spreading of the phase and to a Gaussian decay of the temporal coherence function with a characteristic time $\propto N^{1/2}$. In the absence of energy fluctuations, the coherence time scales as N due to the diffusive motion of $\hat{\theta}_0$. We propose a method to measure the coherence time with ultracold atoms, which we predict to be tens of milliseconds for the canonical ensemble unitary Fermi gas.

Keywords: Fermi gases; quantum fluids; quantum coherence; ultracold atoms

1. Setting the stage

Coherent gases of ultracold atoms confined in immaterial non-dissipative traps are unique examples of isolated macroscopic quantum systems. The value of their intrinsic coherence time is therefore a fundamental question. But it is also a practical issue for all the applications which exploit macroscopic coherence, such as interferometry or quantum engineering where one generates non-trivial entangled states by coherent evolution [1, 2, 3]. Coherence time measurements are presently being performed in cold Bose gases [4, 5, 6]. Experiments on Fermi gases, which up to now focused on traditional aspects of the N -body problem, such as thermodynamic properties [7, 8], are moving towards correlation and coherence measurements [9]. This turn will open a new research field, including the strong coupling regime : that of fermionic quantum optics [10]. However, a theory predicting the coherence time of a pair-condensed Fermi gas was missing, except in the limiting case of zero temperature [11]. In this paper we present the first microscopic theory bridging this theoretical gap in a general way. Our approach holds for other physical systems, such as mesoscopic Josephson Junctions, provided that the environment-induced decoherence is sufficiently reduced.

For a Bose-condensed gas of bosons, the finite coherence time is due to the spreading of the probability distribution of the condensate phase change during t . At zero temperature and in presence of interactions, a ballistic phase spreading is caused by atom number fluctuations in the sample. This effect has been measured by interfering two initially mutually-coherent condensates, whose particle number fluctuates due to partition noise [4, 6]. Contrarily to lasers, which are open quantum systems, and somehow unexpectedly, a ballistic spreading persists in Bose-Einstein condensates for a fixed atom number at non-zero temperature [12, 13]. Fluctuations of the energy, another conserved quantity, then play the same role as number fluctuations.

For an unpolarized pair-condensed Fermi gas, the study of coherence time presupposes a clear definition of the condensate phase and of the corresponding operator $\hat{\theta}_0$ [11]. Furthermore, at non-zero temperature the speed of variation of the phase should include the contribution of two excitation branches: the fermionic pair-breaking one and

the bosonic one exciting the pair motion. For the fermionic branch Anderson's Random Phase Approximation (RPA) [14] is enough. For the bosonic branch however, we need the equivalent for fermions of the Bogoliubov method to construct quasiparticle creation $\hat{b}_\alpha^\dagger$ and annihilation $\hat{b}_\alpha$ operators and to express $d\hat{\theta}_0/dt$ in term of these operators. More than that, we need to include interactions among quasiparticles in the evolution of the $\hat{b}_\alpha$. This is a non-trivial consequence of the dependence of condensate wavefunction on the total number of particles N even for a spatially homogeneous system, and clearly goes beyond the RPA program.

2. Correlation function decay

Below the critical temperature, the time-correlation function of the pairing field $\hat{\psi}_\downarrow(\mathbf{r})\hat{\psi}_\uparrow(\mathbf{r}')$ where $\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r})$ is the fermionic field operator of the spin σ component, is dominated at long times by the condensate contribution:

$$g_1(t) = \langle \hat{a}_0^\dagger(t) \hat{a}_0(0) \rangle \quad (1)$$

where $\hat{a}_0 = \int d^3r d^3r' \varphi_0^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{\psi}_\downarrow(\mathbf{r}) \hat{\psi}_\uparrow(\mathbf{r}')$ is the component of the pairing field on the condensate wavefunction [11]. At equilibrium the system is in a mixture of N -body eigenstates $|\psi_\lambda\rangle$, with weights Π_λ . We therefore study the correlation function $g_1^\lambda(t)$ in the eigenstate $|\psi_\lambda\rangle$ of energy E_λ and particle number N_λ . To exploit the weak relative fluctuations in the number of condensed pairs for a large system, we split $\hat{a}_0$ into modulus and phase hermitian operators [11]

$$\hat{a}_0 = e^{i\hat{\theta}_0} \hat{N}_0^{1/2}, \quad (2)$$

and we approximate the number of condensed pairs operator $\hat{N}_0$ by its mean value $\bar{N}_0$ in the equilibrium state to obtain

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 e^{iE_\lambda t/\hbar} \langle \psi_\lambda | e^{-i(\hat{H} + \hat{W})t/\hbar} | \psi_\lambda \rangle \quad (3)$$

The operator $\hat{W}$, difference between $\hat{H}$ transformed by $e^{i\hat{\theta}_0}$ and $\hat{H}$,

$$\hat{W} = e^{-i\hat{\theta}_0} \hat{H} e^{i\hat{\theta}_0} - \hat{H} = -i[\hat{\theta}_0, \hat{H}] - \frac{1}{2}[\hat{\theta}_0, [\hat{\theta}_0, \hat{H}]] + \dots \quad (4)$$

is approximatively N times smaller than $\hat{H}$. Indeed $e^{i\hat{\theta}_0}$, like $\hat{a}_0$, changes the total particle number by a quantity $O(N^0)$. While $\hat{H}$ is an extensive observable, $\hat{W}$ is intensive and the double commutator in (4) is of order $1/N$. In equation (3) formally appears the evolution operator of the Hamiltonian $\hat{H}$ perturbed by $\hat{W}$, and restricted to the eigenstate $|\psi_\lambda\rangle$ of $\hat{H}$. Up to a phase factor, the function $g_1^\lambda/\bar{N}_0$ is then proportional to the probability amplitude that the system prepared in $|\psi_\lambda\rangle$ is still in that state after a time t in the presence of the perturbation $\hat{W}$. A standard way to obtain a non-perturbative approximation of this amplitude is to use the Green function or the resolvent operator $\hat{G}(z) = (z\hat{1} - (\hat{H} + \hat{W}))^{-1}$ of the perturbed Hamiltonian. Within the projectors method (see §III.B.2 of [15]), we introduce an effective non hermitian Hamiltonian $\hat{H}_{\text{eff}}(z)$ governing the evolution restricted to $|\psi_\lambda\rangle$, *id est* $\langle \psi_\lambda | \hat{G}(z) | \psi_\lambda \rangle = (z - \langle \psi_\lambda | \hat{H}_{\text{eff}}(z) | \psi_\lambda \rangle)^{-1}$. This leads to

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 \int_C \frac{dz}{2i\pi} \frac{e^{-i(z-E_\lambda)t/\hbar}}{z - \langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda} \quad \text{with} \quad \langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda = E_\lambda + \langle \hat{W} \rangle_\lambda + \langle \hat{W} \hat{Q}_\lambda \frac{\hat{Q}_\lambda}{z\hat{Q}_\lambda - \hat{Q}_\lambda(\hat{H} + \hat{W})\hat{Q}_\lambda} \hat{Q}_\lambda \hat{W} \rangle_\lambda \quad (5)$$

The integration domain C in the complex plane is any straight line $z = x + i\eta$, $\eta > 0$ fixed, where the real number x runs from $+\infty$ to $-\infty$. The notation $\langle \hat{A} \rangle_\lambda \equiv \langle \psi_\lambda | \hat{A} | \psi_\lambda \rangle$ was used, and the operator $\hat{Q}_\lambda = \hat{1} - |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$, that projects orthogonally to $|\psi_\lambda\rangle$, was introduced. Keeping in $\langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda$ terms up to order two in $\hat{W}$, hence omitting $\hat{Q}_\lambda \hat{W} \hat{Q}_\lambda$ in the denominator, and neglecting the z dependence $\langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda \approx \langle \hat{H}_{\text{eff}}(E_\lambda + i0^+) \rangle_\lambda$ (pole approximation), we obtain^{1 2}

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 e^{-i\langle \hat{W} \rangle_\lambda t/\hbar} e^{-(i\delta_\lambda + \gamma_\lambda)t} \quad \text{with} \quad \hbar(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda) = \langle \hat{W} \hat{Q}_\lambda \frac{\hat{Q}_\lambda}{(E_\lambda + i0^+)\hat{Q}_\lambda - \hat{Q}_\lambda \hat{H} \hat{Q}_\lambda} \hat{Q}_\lambda \hat{W} \rangle_\lambda \quad (6)$$

1. The pole approximation implicitly assumes that $|\psi_\lambda\rangle$ is coupled to a broad energy continuum [15]. As a consequence the exponential law in (6) holds only at times longer than the inverse frequency width of the continuum, *i.e.* longer than the quasi particle correlation time τ_c introduced below.

2. In order to have a branch cut in the resolvent and a pole in its analytic continuation, which is required to justify rigorously the existence of a nonzero imaginary part γ_λ and to give a precise meaning to Eq. (6), one must take the thermodynamic limit ($N \rightarrow +\infty$ for a fixed density). We face here an unusual subtlety: as shown by a generalisation of the reasoning around Eq. (10), the shift function [15]

Remarkably, $2\gamma_\lambda$ is the decay rate of the state $|\psi_\lambda\rangle$ induced by $\hat{W}$ as predicted by Fermi's golden rule.

The leading term under the exponential in (6) is $\langle \hat{W} \rangle_\lambda$, it is of order N^0 like $\hat{W}$. A key step in its interpretation is to remark that, according to the expansion in (4), in the Heisenberg picture

$$\hat{W}(t) = \hbar \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (7)$$

At this stage it may seem difficult to obtain a tractable explicit expression of $d\hat{\theta}_0/dt$ and to go beyond a purely formal result for the phase dynamics. Fortunately this is not the case and, as we will show in the next section, the coarse grained time average of $d\hat{\theta}_0/dt$ in a weakly excited gas is proportional to a chemical potential operator, which is in essence a thermodynamic quantity:

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} = \mu_0(\hat{N}) + \sum_{s=F,B} \sum_{\alpha} \frac{d\epsilon_{s,\alpha}}{dN} \hat{n}_{s,\alpha} \quad (8)$$

The sum on the right hand side runs over both the gapped quasiparticles fermionic branch of excitation (in the homogeneous case α includes both an orbital and a spin index, $\alpha = \mathbf{k}, \sigma$) and the bosonic one which, in the thermodynamic limit and for an homogeneous system, has a phononic behaviour (α is then only orbital, $\alpha = \mathbf{q}$). By requiring that the gas is weakly excited we mean that the thermal depletion of the condensate of pairs must be small. This requires in particular that the average number of quasiparticles is a small fraction of the total particle number. The coarse grained time average is taken over a time long with respect to the inverse of the quasiparticle eigenfrequencies $\epsilon_{s,\alpha}/\hbar$ yet short with respect to the typical time-scale of variation of the quasiparticle number operators $\hat{n}_{s,\alpha}$, which is allowed if the quasiparticles are in the weakly collisional regime. Finally $\mu_0(N)$ is the zero temperature chemical potential of the gas with N particles, that is the derivative of the ground state energy with respect to N . We interpret the second term on the right hand side of (8) as a “chemical potential operator” in the sense that its quantum average is the adiabatic derivative of the quasiparticle gas energy $\sum_{s=F,B} \sum_{\alpha} \epsilon_{s,\alpha} \langle \hat{n}_{s,\alpha} \rangle$ with respect to N , that is at fixed quasiparticle populations $\langle \hat{n}_{s,\alpha} \rangle$. Equation (8) establishes the link between the phase derivative and the chemical potential at the level of quantum mechanical operators in a multimode microscopic theory. In that respect, it goes beyond the usual second Josephson relation for the phase of the superconducting order parameter (see §3.4 in reference [16]).

By taking the average of equation (8) in the stationary state $|\psi_\lambda\rangle$ and using the Eigenstate thermalization hypothesis [17] to identify the quantum average in an eigenstate with the microcanonical average, we recognize the microcanonical chemical potential μ_{mc} at energy E_λ and particle number N_λ and obtain:

$$\hbar \left\langle \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} \right\rangle_\lambda = -2\mu_{mc}(E_\lambda, N_\lambda) \quad (9)$$

$\Delta_\lambda(z) \equiv \langle \hat{W} \hat{Q}_\lambda \frac{\hat{Q}_\lambda}{\hat{Q}_\lambda z + \hat{Q}_\lambda(E_\lambda - \hat{H}) \hat{Q}_\lambda} \hat{Q}_\lambda \hat{W} \rangle_\lambda$, with $\text{Im } z > 0$, tends to zero as $1/N$, and so does $\delta_\lambda - i\gamma_\lambda$ in (6). The way out is to introduce a time scale of order N , setting $t = N\tau$ with τ fixed at the thermodynamic limit. One performs the change of variable $z = E_\lambda + \langle \hat{W} \rangle_\lambda + z'/N$ in the integral of (5) and one chooses $\eta = \eta'/N$ ($\eta' > 0$ fixed) in the integration domain $C = \{z = x + i\eta, x = +\infty \rightarrow -\infty\}$, which leads to the integration domain $C' = \{z' = x' + i\eta', x' = +\infty \rightarrow -\infty\}$ over z' , and one neglects the term $\langle \hat{W} \rangle_\lambda$ in the denominator of the shift function, as well as the term $\text{Re } z'/N$ (to be consistent with the omission of $\hat{Q}_\lambda \hat{W} \hat{Q}_\lambda$). The factor $1/N$ in the element of integration $dz = dz'/N$ allows one to pull out a factor $1/N$ in the denominator of the integrand, and one obtains in the thermodynamic limit the following result,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{g_1^\lambda(t) e^{i\langle \hat{W} \rangle_\lambda t / \hbar}}{N_0} \simeq \int_{C'} \frac{dz'}{2i\pi} \frac{e^{-iz'\tau/\hbar}}{z' - \hbar\Omega_\lambda} = e^{-i\Omega_\lambda \tau} \quad \text{with} \quad \hbar\Omega_\lambda = \lim_{N \rightarrow +\infty} N\Delta_\lambda(i\eta'/N)$$

which is η' -independent due to the analyticity of the integrand in the half-plane $\text{Im } z' > 0$. For a large but finite size system, this leads to the definition $N(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda) \equiv \Omega_\lambda$. If one rather takes the thermodynamic limit at fixed t before setting t to infinity, one obtains, after expansion of the integrand of (5) to first order in the shift function, *another* definition: $\lim_{N \rightarrow +\infty} N[N_0^{-1} g_1^\lambda(t) e^{i\langle \hat{W} \rangle_\lambda t / \hbar} - 1] \sim (-it)N(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda)$ with $N(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda) \equiv \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \lim_{N \rightarrow +\infty} N\Delta_\lambda(i\eta)$. To show the equivalence of these two definitions, let us inject in the shift function a closure relation on the eigenstates of $\hat{H}$, $\Delta_\lambda(z) = \sum_{\mu \neq \lambda} |\langle \psi_\mu | \hat{W} | \psi_\lambda \rangle|^2 / (z + E_\lambda - E_\mu)$, and let us show that the granularity of the distribution of $E_\mu - E_\lambda$ in this weighted sum tends to zero faster than η'/N . To this end, we view each eigenstate as a coherent superposition of a central phonon Fock state and of a weak halo of phonon Fock states that emanate from the central one by Beliaev-Landau processes 1 phonon $\leftrightarrow$ 2 phonons. Even if $\hat{W}$ preserves the phonon number, see Eq. (8), it can couple the central Fock state of $|\psi_\mu\rangle$ to the halo of $|\psi_\lambda\rangle$. At worst, a single Beliaev-Landau process is involved, in which case $E_\mu - E_\lambda = \pm(\epsilon_{B,\mathbf{k}_1} + \epsilon_{B,\mathbf{k}_2} - \epsilon_{B,\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2})$, where $\mathbf{k}_1$ and $\mathbf{k}_2$ are the wavevectors of the two emitted or absorbed phonons; since the pair $\{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\}$ takes a number $\propto V^2$ of different values, where V is the volume of the system, $E_\mu - E_\lambda$ varies by steps $\propto 1/V^2$, which is indeed $\ll \eta'/N$.

We omitted here the coarse grained time average as the quantum average is taken in an exact eigenstate of the system.

The next term under the exponential in (6) is of order $1/N$ and subleading. In order to show that, we express this term in terms of the correlation function of $d\hat{\theta}_0/dt$ in $|\psi_\lambda\rangle$: up to a contribution of order $1/N^2$,

$$\gamma_\lambda + i\delta_\lambda = \int_0^{+\infty} dt \left[\left\langle \frac{d\hat{\theta}_0(t)}{dt} \frac{d\hat{\theta}_0(0)}{dt} \right\rangle_\lambda - \left\langle \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} \right\rangle_\lambda^2 \right] \quad (10)$$

This is equivalent to (6) as can be checked by inserting a closure relation on the eigenstates of $\hat{H}$. The $t = 0$ value of the integrand is $\text{Var}_\lambda(d\hat{\theta}_0/dt) = O(1/N)$ (this comes from adding up the variances of independent quasiparticles numbers in the canonical ensemble and it overestimates the microcanonical variance); the function then decays in a time τ_c which is the typical collision time of quasiparticles and hence the correlation time of the $\hat{n}_{s,\alpha}$. Altogether we estimate $|\gamma_\lambda + i\delta_\lambda| \approx \tau_c \text{Var}(d\hat{\theta}_0/dt) = O(1/N)$. The energy shift δ_λ is thus of the same order in N as the subleading term $[\hat{\theta}_0, [\hat{\theta}_0, \hat{H}]]$ in $\hat{W}$, i.e. N times smaller than (9); we neglect both terms for a large system. In contrast, we keep γ_λ , since it is the only term which leads to an exponential decay of the correlation function g_1^λ . Eq. (10) provides a physical interpretation of γ_λ , if one remembers that, in the brownian motion theory, the integral of the velocity correlation function gives the position diffusion coefficient. γ_λ is thus the phase diffusion coefficient of the condensate of pairs when the system is prepared in the microcanonical ensemble corresponding to $|\psi_\lambda\rangle$, hence the notation $\gamma_\lambda = D(E_\lambda, N_\lambda)$. We finally keep

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 e^{2i\mu_{mc}(E_\lambda, N_\lambda)t/\hbar} e^{-D(E_\lambda, N_\lambda)t} \quad (11)$$

Eq. (10) even gives a way of calculating D : If one can write kinetic equations for the quasiparticles numbers appearing in $d\hat{\theta}_0/dt$, see Eq. (8), one can calculate their time correlation functions as done for bosons in reference [18] and conclude that

$$D(E, N) = -(P\vec{A}) \cdot M^{-1} C_{mc} P\vec{A} \quad (12)$$

The matrix M , with coefficients $M_{s\alpha, s'\alpha'}$, is the matrix of the linearised kinetic equations $\frac{d}{dt}\vec{\delta n} = M\vec{\delta n}$ that give the evolution of the fluctuations $\delta n_{s,\alpha}$ of the quasiparticle numbers, collected in a single vector $\vec{\delta n}$, around their stationary values $\bar{n}_{s,\alpha}$. To define the other notations, one introduces as in [18] the covariance matrix C_{can} of the quasiparticle numbers $\hat{n}_{s,\alpha}$ in the canonical ensemble with N particles and a mean energy E , the energy vector $\vec{\epsilon}$ with components $\epsilon_{s,\alpha}$ and its dual vector $\vec{\epsilon} \propto C_{can}\vec{\epsilon}$ normalised such that $\vec{\epsilon} \cdot \vec{\epsilon} = 1$.³ The vector $\vec{A} = (2/\hbar) d\vec{\epsilon}/dN$ then collects the coefficients of $\hat{n}_{s,\alpha}$ in the expression (8) of $-d\hat{\theta}_0/dt$, the matrix P is the non-orthogonal projector⁴ such that $P\vec{\delta n} = \vec{\delta n} - \vec{\epsilon}(\vec{\epsilon} \cdot \vec{\delta n})$ for all $\vec{\delta n}$, and the microcanonical covariance matrix is $C_{mc} = P^\dagger C_{can} P$ [18].

The final step is to take the statistical average of Eq. (11) over the probability distribution Π_λ of the states $|\psi_\lambda\rangle$ that constitute the mixed state of the system. For large N , we assume that energy and atom number fluctuations around the mean values $\bar{E}$ and $\bar{N}$ are weak in relative value. This is the case if, for example, Π_λ describes a canonical or grand canonical ensemble. We assume Gaussian fluctuations and linearize μ_{mc} around $(\bar{E}, \bar{N})$ while, to this order, we keep only the central value $D(\bar{E}, \bar{N})$ of the next-to-leading term. We are led to the calculation of a Gaussian integral with a phase factor $\exp[2i[(\partial\mu_{mc}(\bar{E}, \bar{N})/\partial E)(E - \bar{E}) + (\partial\mu_{mc}(\bar{E}, \bar{N})/\partial N)(N - \bar{N})]t/\hbar]$. Altogether this leads to the main result of this work :

$$g_1(t) \simeq \bar{N}_0 e^{2i\mu_{mc}(\bar{E}, \bar{N})t/\hbar} e^{-t^2/2t_{br}^2} e^{-D(\bar{E}, \bar{N})t} \quad (13)$$

In presence of energy or atom number fluctuations, the thermal blurring at long times consists in a Gaussian decay of the correlation function $g_1(t)$, with a characteristic time

$$(2t_{br}/\hbar)^{-2} = \text{Var} \left(N \frac{\partial\mu_{mc}}{\partial N}(\bar{E}, \bar{N}) + E \frac{\partial\mu_{mc}}{\partial E}(\bar{E}, \bar{N}) \right) \quad (14)$$

which diverges as $N^{1/2}$ for normal fluctuations. The phase diffusion coefficient D leads to an exponential decay with a characteristic time diverging as N . As expected it is a subleading effect at long times, except if the system is prepared in the microcanonical ensemble in which case the intrinsic phase diffusion may be directly observed.

3. One has $(C_{can})_{s\alpha, s'\alpha'} = \delta_{s\alpha, s'\alpha'} \bar{n}_{s,\alpha} (1 \pm \bar{n}_{s,\alpha})$ and $\bar{n}_{s,\alpha} = 1/[\exp(\epsilon_{s,\alpha}/k_B T) \mp 1]$ where the upper (lower) sign holds for the bosonic (fermionic) excitation branch. $\vec{\epsilon}$ and $\vec{\epsilon}$ are left and right eigenvectors of M with a zero eigenvalue, as shown by the conservation of energy and the inspiring rewriting $\vec{\epsilon} \propto d\vec{n}/dT$, where T is the canonical ensemble temperature and $\vec{n}$ is the vector with components $\bar{n}_{s,\alpha}$ [18].

4. $P\vec{\epsilon} = \vec{0}$ and $P^\dagger$ projects onto the subspace of fluctuations $\vec{\delta n}$ of zero energy, $\{\vec{\delta n} | \vec{\epsilon} \cdot \vec{\delta n} = 0\}$, inside which one defines the inverse of the matrix M .

3. Microscopic derivation of the phase operator equation

We give here the first (to our knowledge) microscopic derivation of equation (8), relating the evolution of the phase operator of a pair-condensed gas to a “chemical potential operator”.

The contribution of the fermionic branch of excitations to $d\hat{\theta}_0/dt$ can be obtained from linearized equations of motion for small fluctuations of the pair operators $\hat{\psi}_\downarrow\hat{\psi}_\uparrow$, $\hat{\psi}_\uparrow^\dagger\hat{\psi}_\downarrow^\dagger$ and $\hat{\psi}_\sigma^\dagger\hat{\psi}_\sigma$ around the mean-field state in Anderson’s Random Phase Approximation (RPA) [14]. Using equation (120) of reference [11] to extract the time average of $d\hat{\theta}_0/dt$, and rewriting equation (86) of the same reference in terms of the fermionic quasiparticle occupation numbers $\hat{n}_{F,\alpha}$, we get⁵

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} \Big|_{\text{RPA}} = \mu(\bar{N}) + \frac{d\mu}{dN}(\hat{N} - \bar{N}) + \sum_{\alpha=\mathbf{k},\sigma} \frac{d\epsilon_{F,\alpha}}{dN} \hat{n}_{F,\alpha} \quad (15)$$

where $\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}$ is the BCS excitation spectrum of an homogeneous system and $\bar{N}$ the BCS average particle number in the grand canonical ensemble of chemical potential μ .⁶

We encountered fundamental difficulties in deriving the phonon branch contribution to equation (8) within the RPA.⁷ We therefore decided to treat the problem variationally with the most general time-dependent pair coherent state Ansatz:⁸

$$|\psi\rangle = \mathcal{N}(t) \exp \left(l^6 \sum_{\mathbf{r},\mathbf{r}'} \Gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}';t) \hat{\psi}_\uparrow^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}_\downarrow^\dagger(\mathbf{r}') \right) |0\rangle, \quad (16)$$

Here $\mathcal{N}$ ensures normalization and the $\Gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ form a set of independent variables. The space has been discretized on a cubic lattice of step l , which we take to zero in the end of the calculations. The field operators obey anticommutation relations of the kind: $\{\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r}), \hat{\psi}_{\sigma'}^\dagger(\mathbf{r}')\} = \delta_{\sigma,\sigma'} \delta_{\mathbf{r},\mathbf{r}'} / l^3$. Section §9.9b of reference [19] constructs from $\Gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')$, $\Gamma^*(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ the set of canonically conjugate variables $\Phi(\mathbf{r},\mathbf{r}')$, $\Phi^*(\mathbf{r},\mathbf{r}')$.⁹ This field Φ should not be confused with the usual pairing field $\langle \hat{\psi}_\downarrow \hat{\psi}_\uparrow \rangle$.¹⁰ When the pairs in (16) are at rest, $\Gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}';t)$ depends only on $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$ and the Fourier transform of Φ reproduce the $V_{\mathbf{k}}$ amplitude of the $\mathbf{k} \uparrow, -\mathbf{k} \downarrow$ pair of BCS theory [11], while the Fourier transform of the pairing

5. We use $\frac{\Delta_0}{\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}} \hat{\zeta}_{\mathbf{k}} = \hat{n}_{F,\mathbf{k},\uparrow} + \hat{n}_{F,-\mathbf{k},\downarrow}$ where Δ_0 and $\hat{\zeta}_{\mathbf{k}}$ refer to notations of [11], and we use Eq. (74) of that reference to recognize $d\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}/d\mu$.

6. To obtain Eq. (15) in this form we reintroduced the trivial phase term $-2\mu(\bar{N})t/\hbar$ that does not appear in the reference [11] due to the use of the grand canonical Hamiltonian.

7. The RPA result (15), restricted to the linear order in the pair operators, does not include the contribution of the phonon branch. One might hope to obtain this contribution by pushing the RPA calculation to the quadratic order in the pair operators as follows: First, one computes $d\hat{\theta}_0/dt$ up to the quadratic order. Second, one collects all the RPA pair operators inducing a center of mass momentum change $\hbar\mathbf{q}$, that is $\hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q}\downarrow} \hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow}$, $\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger$, $\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow}$ and $\hat{a}_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q}\downarrow}$, where $\hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow}$ annihilates a fermion of wave vector $\mathbf{k}$ and spin $\uparrow$, and one writes the matrices $\mathcal{L}_{\mathbf{q}}$ of their closed linear RPA equations of motion. Each RPA matrix $\mathcal{L}_{\mathbf{q}}$ has two collective modes, with opposite energies linear in $\mathbf{q}$ for small $\mathbf{q}$. The RPA operators are then expanded over the eigenmodes of $\mathcal{L}_{\mathbf{q}}$, with amplitudes $\hat{b}_{-\mathbf{q}}$ and $\hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger$ on the collective modes that annihilate and create a collective excitation of momentum $\mp\hbar\mathbf{q}$. Third, one inserts this modal expansion in the RPA operators appearing in $d\hat{\theta}_0/dt$ and obtains a quadratic expression in the modal amplitudes, hence terms in $\hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{q}}$ as in (8). Unfortunately, this RPA approach is not reliable and must be abandoned because the RPA operators, although linearly independent, are not quadratically independent, as one can see by rearranging the pair operators using fermionic anticommutation relations, e.g.

$$(\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow}) (\hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q}\downarrow}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{k}\downarrow}) = (\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q}\downarrow}^\dagger) (\hat{a}_{-\mathbf{k}\downarrow} \hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow})$$

This shows that (i) there is no unique way of expressing $d\hat{\theta}_0/dt$ as a quadratic function of the RPA operators, (ii) the modal amplitudes are not quadratically independent, (iii) the coefficient of $\hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{q}}$ is not uniquely determined by this RPA approach.

8. We use here for simplicity an Ansatz of the time-dependent BCS type in which the number of particles has quantum fluctuations (not to be confused with the thermal fluctuations of the grand canonical ensemble). The use of an Ansatz with a fixed number of particles, possible although more difficult [16], would change the coefficients in the energy functional by a relative correction $O(N^{-1/2})$ and would not change the spectrum in the thermodynamic limit.

9. Our variables Γ and Φ correspond to the variables z and β of reference [19] when one replaces the quasiparticle operators and vacuum in Eq. (9.132) of [19] by the particle ones. If $\underline{\Gamma}$ and $\underline{\Phi}$ are the matrices of elements $l^3\Gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ and $l^3\Phi(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ respectively, then $\underline{\Phi} = -\underline{\Gamma}(1 + \underline{\Gamma}^\dagger \underline{\Gamma})^{-1/2}$ according to Eq. (9.144) of [19]. Their variational equations of motion follow from the usual Lagrangian $L = i\hbar [\langle \psi | (d/dt) | \psi \rangle - \text{c.c.}] / 2 - \langle \psi | H | \psi \rangle$. Φ is cleverly defined such that $L = i\hbar l^6 \sum_{\mathbf{r},\mathbf{r}'} [\Phi^*(\mathbf{r},\mathbf{r}') \partial_t \Phi(\mathbf{r},\mathbf{r}') - \text{c.c.}] / 2 - \mathcal{H}(\Phi, \Phi^*)$, leading to $\partial_t \Phi = (i\hbar l^6)^{-1} \partial_{\Phi^*} \mathcal{H}$. This shows that the conjugate variable of Φ in the Hamiltonian formalism is $i\hbar l^6 \Phi^*$ for the usual Poisson brackets, that is Φ^* for the Poisson brackets $\{\Phi, \Phi^*\} = (i\hbar l^6)^{-1}$, knowing that one must have $\partial_t \Phi = \{\Phi, \mathcal{H}\}$.

10. With the same matrix notation as in note 9 one has $\langle \hat{\psi}_\uparrow \hat{\psi}_\downarrow \rangle = \underline{\Phi}(1 - \underline{\Phi}^\dagger \underline{\Phi})^{1/2}$, according to Eq. (9.146) of the reference [19].

field is $-U_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}} = -V_{\mathbf{k}}(1 - |V_{\mathbf{k}}|^2)^{1/2}$. For moving pairs we have no physical interpretation, but the squared norm of Φ is still half the mean number of particles in the state $|\psi\rangle$:

$$\frac{N}{2} = \|\Phi\|^2 \equiv l^6 \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} |\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t)|^2. \quad (17)$$

The classical Hamiltonian governing the evolution of the field Φ is given by

$$\mathcal{H}(\Phi, \Phi^*) = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle. \quad (18)$$

and may be expressed explicitly using Wick's theorem. In the following however, we will only need the invariance of $\mathcal{H}$ under a global phase change $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rightarrow e^{i\gamma} \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, $\forall \gamma \in \mathbb{R}$ ($U(1)$ symmetry), consequence of the conservation of the particle number $\hat{N}$ by evolution with $\hat{H}$. At zero temperature and for a fixed N the field $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ is frozen, up to a global phase factor, into the minimizer $\Phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (N/2)^{1/2} \phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ of $\mathcal{H}$. ϕ_0 is chosen real and normalized to one. It depends on N even in the spatially homogeneous case and differs from the condensate wavefunction φ_0 in the same way that Φ differs from the pairing field $\langle \hat{\psi}_\downarrow \hat{\psi}_\uparrow \rangle$ (see note 10). At sufficiently low temperature one can expand $\mathcal{H}$ in powers of the small deviations of Φ away from the circle $\gamma \mapsto e^{i\gamma} \Phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, locus of the minima of $\mathcal{H}$ for fixed N . To this end, we split the field into its components parallel and orthogonal to ϕ_0 :

$$\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = e^{i\theta} [n^{1/2} \phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] \quad (19)$$

The phase θ can reach arbitrarily large values while Λ is bounded. This framework allows us to develop a systematic perturbation theory in powers of the field Λ (see appendix A), the fermionic equivalent of the Bogoliubov $U(1)$ -symmetry conserving approach for bosons [20]. Provided that Λ stays small, the phase θ remains close to the condensate phase θ_0 as we shall see. We therefore write down the equations of motion of θ and of the fields Λ, Λ^* . At the end of the calculations we systematically eliminate the condensate variables with the relation $n = N/2 - \|\Lambda\|^2$, consequence of (17), and we restrict ourselves to order 2 in Λ, Λ^* .

The main challenge of the calculation is the occurrence of a term linear in Λ, Λ^* in $d\theta/dt$, resulting from the fact that ϕ_0 depends on the number of pairs [11]. Without this term, one would simply expand the field Λ on the eigenmodes of its small linear oscillations obtained from a quadratization of the Hamiltonian $\mathcal{H}$ at fixed N :

$$\begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t) \\ \Lambda^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t) \end{pmatrix} = \sum_{\alpha} b_{\alpha}(t) \begin{pmatrix} u_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ v_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \end{pmatrix} + b_{\alpha}^*(t) \begin{pmatrix} v_{\alpha}^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ u_{\alpha}^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \end{pmatrix} \quad (20)$$

where the sum runs over the eigenmodes of positive energy ϵ_{α} , normalized as $\|u_{\alpha}\|^2 - \|v_{\alpha}\|^2 = 1$. To this order, $b_{\alpha}(t) = b_{\alpha}(0)e^{-i\epsilon_{\alpha}t/\hbar}$. One would insert the expansion (20) into $d\theta/dt$ and take a coarse grained temporal average to get rid of the oscillating terms. $\overline{d\theta/dt}$ would then contain the expected linear combination of the numbers of bosonic quasiparticles $n_{B,\alpha} = |b_{\alpha}|^2$. In reality, the problem is more subtle: due to the interaction among the quasiparticles, $\overline{b_{\alpha}}$ does not vanish and is of order two in Λ and Λ^* . The contribution of the linear term in $d\theta/dt$ is then comparable to that of the quadratic ones. It is calculated in the appendix A, using in particular the bounded nature of the field Λ (a consequence of the $U(1)$ -symmetry preserving nature of the expansion (19)) and the Hellmann-Feynman theorem. One finds

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\overline{\theta}}{dt} = \mu_0(N) + \sum_{\alpha} \frac{d\epsilon_{\alpha}}{dN} |b_{\alpha}|^2 + O(\|\Lambda\|^3) \quad (21)$$

We now briefly discuss the form of the energy spectrum ϵ_{α} for a spatially homogeneous system, in the continuous limit $l \rightarrow 0$ for a s -wave contact interaction with a fixed scattering length between opposite spin fermions. For each value of the total wave vector $\mathbf{q}$, there exists (i) at most one discrete value $\epsilon_{B,\mathbf{q}}$, (ii) a continuum parametrized by two wave vectors $(\mathbf{k}_1, \uparrow; \mathbf{k}_2, \downarrow) \mapsto \epsilon_{F,\mathbf{k}_1,\uparrow} + \epsilon_{F,\mathbf{k}_2,\downarrow}$ of constant sum $(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{q})$, where $\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}$ is the BCS dispersion relation. The branch $\epsilon_{B,\mathbf{q}}$ coincides with that of reference [21], as we have checked. It has a phononic start and corresponds to the bosonic elementary excitations of the Fermi gas, whose contribution to the phase dynamics was missing. The continuum corresponds to the excitation of two fermionic quasiparticles. Indeed, since the Hamiltonian $\hat{H}$ contains an even number of factors $\hat{\psi}$ and $\hat{\psi}^\dagger$, each annihilating or creating one quasiparticle, fermionic quasiparticles can only




Figure 1: Some experimental considerations: (a) Trapping configuration proposed here to measure $g_1(t)$ via Ramsey interferometry: the condensed paired Fermi gas is confined in the main trap (with a flat bottom on the figure); one transfers on average at most two atoms (in the form of a dimer) in the (very narrow) secondary trap via a resonant tunneling effect, which can be tuned by a barrier of adjustable height; in this way, one creates a phase reference, which is made to interfere with the condensate after an evolution time t . (b) Thermal blurring time of a coherent Fermi gas in the unitary limit in the canonical ensemble, as a function of temperature T in units of the Fermi temperature $T_F = \varepsilon_F/k_B$. Discs: from the equation of state measured in reference [8]. Dashed line: expression (22) deduced from an approximated equation of state (see text).

be created by pairs from the ground state. The corresponding biexcitations are not physically independent,¹¹ and duplicate the contribution of the RPA to $d\hat{\theta}_0/dt$. They must therefore not be included in Eq. (21).

Two more remarks are needed to obtain (8). (i) The fields $\langle \hat{\psi}_\downarrow \hat{\psi}_\uparrow \rangle$ and Φ differ and so do the phases $\hat{\theta}_0$ and θ . Their coarse grained temporal averages, however, only differ by a term of order $\|\Lambda\|^2$, which, bounded hence negligible in the long time limit, does not contribute to the phase blurring of the condensate of pairs.¹² (ii) The phase θ of our variational approach is a classical variable, whereas $\hat{\theta}_0$ in (8) is a quantum operator. This gap can be bridged by using the quantization procedure exposed in Chapter 11 of reference [19] where the b_α of the bosonic branch are in the end replaced by bosonic operators¹³ $\hat{b}_\alpha$, $[\hat{b}_\alpha, \hat{b}_\alpha^\dagger] = 1$. We argue that equation (8), linking $d\hat{\theta}_0/dt$ to the chemical potential operator, and the resulting equation (13) should hold beyond the validity range of the microscopic variational derivation presented above, and should apply even to the strongly interacting regime, provided that the temperature is low enough for the quasiparticles lifetime to be much longer than the inverse of their eigenfrequency. Indeed, in the limiting case where one can neglect the fermionic excitation branch and drop the non-phononic part of the bosonic branch, Eq. (8) can be derived from the irrotational version of the quantum hydrodynamic theory of Landau and Khalatnikov [22] (see appendix B).

4. Towards an experimental observation

Let us briefly explain how an experimental evidence of the thermal blurring of a condensate of pairs could be obtained. The key idea is to bosonize the atomic Cooper pairs into deeply bound weakly interacting dimers during the preparation and the measurement stage. This can be done in an adiabatic reversible way [23] by tuning the scattering length to a small and positive value thanks to a magnetic Feshbach resonance. It allows one to (i) produce a sample of dimers with weak number fluctuations from a melted Mott phase of an experimental realization of the Bose Hubbard model [24], (ii) control tunneling between the main trap (containing the N particles) and a very narrow secondary trap by adjusting the height of a potential barrier [2] (Fig.1a), (iii) detect by fluorescence a single dimer [25] in this secondary trap. For the measurement of the $g_1(t)$ function, we adapt to the case of paired fermions the interferometric

11. Exciting $\alpha = (\mathbf{k}_1, \uparrow; \mathbf{k}_2, \downarrow)$ and $\alpha' = (\mathbf{k}'_1, \uparrow; \mathbf{k}'_2, \downarrow)$ amounts to exciting $\alpha'' = (\mathbf{k}'_1, \uparrow; \mathbf{k}_2, \downarrow)$ and $\alpha''' = (\mathbf{k}_1, \uparrow; \mathbf{k}'_2, \downarrow)$.

12. Expressing in $\langle \hat{\theta}_0 \rangle$ the pairing field in terms of Φ , one realizes that, for small Λ , $\langle \hat{\theta}_0 \rangle = e^{i\theta} \sqrt{N_0}(1 + O(\|\Lambda\|))$ and, since $\overline{\Lambda}^t = O(\|\Lambda\|^2)$, one has $\overline{\theta}_0^t = \bar{\theta}^t + O(\|\Lambda\|^2)$.

13. More precisely, these operators are bosonic only for a weak density of excitations. For a spatially homogeneous system and in a $U(1)$ symmetry breaking formalism ($\theta = 0$), we obtain from Eq.(11.81c) of [19] extended to the paired case ($\hat{a}_p, \hat{a}_h^\dagger$ replaced by the BCS fermionic quasiparticle annihilation operators $\hat{b}_{\mathbf{k}\sigma}$) and restricted to weakly excited bosonic images ($\mathbb{B}\mathbb{B}^\dagger$ negligible): $\hat{b}_{\mathbf{q}} = \sum_{\mathbf{k}} X_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}} \hat{b}_{-\mathbf{k}\downarrow} \hat{b}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow} + Y_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}} \hat{b}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}\uparrow}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger$. The real coefficients $X^{\mathbf{q}}$ and $Y^{\mathbf{q}}$ are linear combinations of the corresponding $u_{\mathbf{q}}$ and $v_{\mathbf{q}}$ in Eq.(20), and inherit the normalization condition $\sum_{\mathbf{k}} (X_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}})^2 - (Y_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}})^2 = 1$. Then in a state (16) with $\theta = 0$, $\hat{\delta}_{\mathbf{q}} \equiv [\hat{b}_{\mathbf{q}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] - \hat{1}$ has a mean value and a variance $O(\|\Lambda\|^2/N)$ since $\hat{b}_{\mathbf{k}\sigma}|\psi\rangle = O(\|\Lambda\|/N^{1/2})$ if $\|\Lambda\|/N^{1/2} \rightarrow 0$.

Ramsey method of reference [26], where two Rabi pulses are applied at a time interval t . The bosonized pairs are prepared initially in the main trap. A first pulse of angle ϵ transfers on average less than one dimer to the secondary trap; in this way, the thermal blurring is not masked by partition noise. Then the system evolves during a time t with interactions set to the value at which phase dynamics is to be studied. Last, the gas is rebosonized and a second pulse of angle ϵ closes the interferometer before the number n_{sec} of dimers in the secondary trap is measured. The average of n_{sec} over the realizations is an oscillating function of the time t , of angular frequency $2/\hbar$ times the difference of the two trapping zones chemical potentials, and of contrast equal to $|g_1(t)/g_1(0)|$.

5. Explicit results for the unitary gas

We first estimate the blurring time for a unitary Fermi gas prepared in the canonical ensemble, that is with energy fluctuations of variance $\text{Var } E = k_B T^2 \partial_T \bar{E}$. From the equation of state of the unpolarized unitary gas measured in reference [8], and for a spatially homogeneous system (in a flat bottom potential [27]) we find the thermal blurring times t_{br} plotted as discs in figure 1b. For example, at a temperature $T = 0.12 T_F \simeq 0.7 T_c$, where T_c is the pair condensation temperature, we find $t_{\text{br}} \approx 7N^{1/2}\hbar/\epsilon_F$ corresponding to 20 milliseconds for a typical Fermi temperature $T_F = \epsilon_F/k_B = 1\mu\text{K}$ and a typical atom number $N = 10^5$. As in reference [28], one can also estimate the equation of state of the unitary gas from simple dispersion relations for the elementary excitations. For the bosonic branch one takes [28] $\epsilon_{B,q} = \hbar cq$ with c the $T = 0$ sound velocity, $mc^2 = \frac{2}{3}\xi\epsilon_F$ and ξ the Bertsch parameter. For the fermionic branch, one takes [29] $\epsilon_{F,k,\sigma} = \Delta + (\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \epsilon_0)^2/(2f_0)$, where Δ is the gap, and ϵ_0 and f_0 give the location of the minimum and the curvature of the dispersion relation. Keeping each branch contribution to the mean volumic energy to its leading order at low temperature $\bar{E}_F/V \simeq \frac{2m^{3/2}}{\pi^{3/2}\hbar^3}(\epsilon_0 f_0 k_B T)^{1/2} \Delta e^{-\Delta/k_B T}$ and $\bar{E}_B/V \simeq \frac{\pi^2}{30}(k_B T)^4/(\hbar c)^3$ as in [28] and using the experimental values [8, 30] $\xi = 0.376$, $\Delta = 0.44\epsilon_F$, $\epsilon_0 = 0.85\epsilon_F$ and the theoretical value [29] $f_0 = 0.846\epsilon_F$, we find

$$\frac{N\hbar^2}{(t_{\text{br}}\epsilon_F)^2} \simeq \left(\frac{\Theta}{0.46}\right)^5 \frac{(1+2r)^2}{(1+r)} \quad (22)$$

with $\Theta = T/T_F$ and $r \equiv \partial_T \bar{E}_F / \partial_T \bar{E}_B \simeq \left(\frac{0.316}{\Theta}\right)^{9/2} e^{-0.44/\Theta}$ the relative weight of the two excitation branches. This formula,¹⁴ plotted as a dashed line in figure 1b, is an exact equivalent to t_{br} for $\Theta \rightarrow 0$.

At finite times¹⁵ $t = O(N^0) \ll t_{\text{br}}$, the contribution of D to $g_1(t)$ in equation (13) is *a priori* comparable to that of t_{br}^{-2} since both scale as $1/N$ in the canonical ensemble. D can be calculated at very low temperatures keeping only the phononic part of the spectrum. In the state of the art, it is predicted by various approaches that the bosonic branch is convex at low q for the unitary gas [31, 32, 33],

$$\epsilon_{B,q} \underset{q \rightarrow 0}{=} \hbar cq + \frac{\gamma \hbar^3 q^3}{8m^2 c} + O(q^5) \quad \text{with } \gamma > 0 \quad (23)$$

so that phonons interact through Landau-Beliaev processes 2 phonons $\leftrightarrow$ 1 phonon as in the weakly interacting Bose gas.¹⁶ One can then adapt¹⁷ the low-temperature reduction of the general expression (12) done in reference [18].

14. The good agreement with the experimental data has to be taken cautiously. If one treats the two branches to all order in $k_B T$, one gets an upward shift of $t_{\text{br}}\epsilon_F/(\hbar N^{1/2})$ more or less constant and equal to 5 over the temperature range of figure 1b.

15. Still the times that we consider are subjected to the constraint $t > \tau_c$ (see note 1). For the unitary gas $\tau_c \simeq (0.149/\Theta)^5$ when $\Theta \rightarrow 0$, according to note 17.

16. In the concave case, the leading processes are the scattering events 2 phonons $\leftrightarrow$ 2 phonons as in reference [22].

17. The universalising trick at low temperature is to use, whatever the physical system, $mc/\hbar$ as the unit of wavevector and mc^2 as the unit of energy. Let us then start from the phase diffusion coefficient and the quasiparticle correlation time for weakly interacting bosons [18], $\hbar ND/(mc^2) \sim c_1(k_B T/mc^2)^4$ and $mc^2\tau_c/\hbar \sim c_3\rho[\hbar/(\sqrt{2}mc)]^3(mc^2/k_B T)^5$, where $c_1 \simeq 0.3036$ and $c_3 \simeq 0.05472$, and let us review all the corrective factors connecting the weakly interacting Bose gas to the unitary Fermi gas, knowing that D is a quadratic function of $P\vec{A}$ and a linear function of M^{-1} , see Eq. (12): (i) for a condensate of pairs, there is an additional factor two in the coefficients $\vec{A}$ of $-\partial\theta_0/\partial t$, thus a factor four on D , (ii) the equation of state $\mu_0(\rho) \propto \rho$ is replaced by $\mu_0(\rho) \propto \rho^{2/3}$, where ρ is the density, so the value of $(N/c)dc/dN$ in $\vec{A}$ jumps from $1/2$ to $1/3$, hence a factor $2/3$ on $\vec{A}$ and a factor $4/9$ on D , (iii) $P\vec{A}$, being exactly zero for a linear-in- q bosonic excitation branch due to $\vec{A} \propto \vec{e}$, is proportional at low temperature to the dimensionless curvature parameter γ , equal to one in [18], hence an extra factor γ^2 in D , (iv) according to quantum hydrodynamics [22], the reduced Beliaev-Landau coupling amplitudes among the quasiparticles, at fixed values of the reduced wavevectors, are system-dependent only via a global factor $1 + \Lambda$, with $\Lambda = \rho\mu_0''(\rho)/[3\mu_0'(\rho)]$ jumping from 0 to $\Lambda_u = -1/9$, hence a factor $(1 + \Lambda_u)^{-2}$ on the matrix M^{-1} , on D and on the correlation time τ_c induced by the collisions among the quasiparticles. As a consequence, for the unitary gas, $\hbar ND/(mc^2) \sim c_1[(4\gamma/3)^2/(1 + \Lambda_u)^2](k_B T/mc^2)^4$ and $mc^2\tau_c/\hbar \sim c_3(1 + \Lambda_u)^{-2}\rho[\hbar/(\sqrt{2}mc)]^3(mc^2/k_B T)^5$.

Furthermore, from a numerical solution of the RPA equations of reference [21] we find that $\gamma \approx 0.1$, in agreement with [33, 34], so that

$$\frac{\hbar ND}{\mathcal{E}_F} \underset{\Theta \rightarrow 0}{\sim} C \Theta^4 \quad \text{with} \quad C \simeq 0.4 \quad (24)$$

With this we reach a complete picture of the thermal blurring of the unitary Fermi gas at low temperature.

6. Conclusion

We have presented the first microscopic theory of the thermal blurring of the phase of a condensate of pairs of fermions (13), revealing a ballistic blurring and a subleading phase diffusion. The blurring time depends on the variance of the total energy of the gas, and on the derivative of the microcanonical chemical potential with respect to the energy. The phase diffusion coefficient can be deduced from kinetic equations on the quasiparticle numbers. To obtain these results, we have used the fact that the time derivative of the condensate phase is given by the chemical potential operator of the gas, see equation (8). We have derived this central relation in a fully microscopic way, including both the bosonic and the fermionic branches of excitation. Last, we have proposed a realistic experimental protocol to measure this blurring time, that we estimated to be tens of milliseconds for a coherent gas prepared in the unitary limit in the canonical ensemble.

Acknowledgments

We acknowledge support from the EU project QIBEC under contract number 284 584.

Appendix A. More on the variational calculation

Here we derive equation (21) of the time average of θ within the microscopic model based on the Ansatz (16), coherent state of moving pairs. In a first stage one should perform the expansion of the Hamiltonian $\mathcal{H}$ treating the real quantity n and the complex field Λ in (19) as *independent* variables, that is, not fixing the value of $\|\Phi\|$. To include interactions among the quasiparticles, one must go to third order in Λ and Λ^* :

$$\mathcal{H}(\Phi, \Phi^*) = \mathcal{T}_0[n, \phi_0(N)] + \sum_{j=1}^3 \mathcal{T}_j[n, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^4) \quad (25)$$

where the tensor $\mathcal{T}_j$ is of rank j so that $\mathcal{T}_j(\Lambda, \Lambda^*)$ is exactly of order j in Λ and Λ^* . It may be expressed in terms of the differential of order j of $\mathcal{H}$ taken at $(\Phi, \Phi^*) = (n^{1/2}\phi_0, n^{1/2}\phi_0)$ and restricted to the subspace orthogonal to $(\phi_0, 0)$ and $(0, \phi_0)$, with ϕ_0 assumed to be real. It does not depend on the phase θ due to $U(1)$ symmetry. For a fixed total number of particles, the energy does not vary to first order around the minimizer so that $\mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)] = 0$, which is the famous gap equation when the system is spatially homogeneous. Furthermore, one can check that $\partial_n \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] = 2\mu_0(N)$ where $\mu_0(N) = dE_0(N)/dN$ is the gas chemical potential at zero temperature, $E_0(N) = \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)]$ being the ground state energy.

The phase and the modulus square of the component of the field Φ on the mode ϕ_0 are canonically conjugate variables, so that $-\hbar d\theta/dt = \partial_n \mathcal{H}(\Phi, \Phi^*)$. Once this derivative is taken in (25) for fixed Λ and Λ^* , one can fix the norm of Φ to the value $(N/2)^{1/2}$ (that is the total particle number is fixed to N), and eliminate n through the identity $n = \|\Phi\|^2 - \|\Lambda\|^2$; the field Λ then remains the only dynamical variable of the problem. The resulting expression is useful up to order 2 in Λ, Λ^* :

$$-\hbar \frac{d\theta}{dt} = \partial_n \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] - \|\Lambda\|^2 \partial_n^2 \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] + \sum_{j=1}^2 \partial_n \mathcal{T}_j[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^3) \quad (26)$$

The Hamiltonian that determines the evolution of Λ at fixed particle number is obtained by replacing n with $N/2 - \|\Lambda\|^2$ in (25) and by expanding the resulting expression up to order three in Λ, Λ^* :

$$\mathcal{H}_N(\Lambda, \Lambda^*) = E_0(N) + \tilde{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) + \mathcal{T}_3[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) - \|\Lambda\|^2 \partial_n \mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^4) \quad (27)$$

with the quadratic form $\check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*)$ obtained by subtracting $2\mu_0(N)\|\Lambda\|^2$ from $\mathcal{T}_2[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*)$. To compute the coarse grained time average of $\partial_n \mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*)$, that is the term linear in Λ, Λ^* which is problematic in $d\theta/dt$ (see the main text of the paper), we write the temporal derivative of the imaginary part of the component of the field Λ on the function $(N/2)^{1/2}d\phi_0/dN$,

$$Y \equiv \frac{l^6}{2i} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \left(\frac{N}{2}\right)^{1/2} \frac{d\phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{dN} (\Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - \Lambda^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}')) \quad (28)$$

Since $i\hbar\partial_t\Lambda = l^{-6}\partial_{\Lambda^*}\mathcal{H}_N(\Lambda, \Lambda^*)$, one gets

$$-2\hbar \frac{dY}{dt} = \mathcal{D} \cdot \mathcal{H}_N(\Lambda, \Lambda^*) = \mathcal{D} \cdot \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) + \mathcal{D} \cdot \mathcal{H}_N^{\text{cub}}(\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^3) \quad (29)$$

where $\mathcal{H}_N^{\text{cub}}$ is the component of $\mathcal{H}_N$ of order three in Λ, Λ^* . We have introduced the differential operator

$$\mathcal{D} = \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \left(\frac{N}{2}\right)^{1/2} \frac{d\phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{dN} (\partial_{\Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}')} + \partial_{\Lambda^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}) \quad (30)$$

We shall now take advantage of two identities that exactly hold for all Λ orthogonal to ϕ_0 :

$$2\mathcal{D} \cdot \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) = -\partial_n \mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) \quad (31)$$

$$2\mathcal{D} \cdot \mathcal{H}_N^{\text{cub}}(\Lambda, \Lambda^*) = 2 \frac{d}{dN} \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) - \partial_n \mathcal{T}_2[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + \|\Lambda\|^2 \partial_n^2 \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] \quad (32)$$

To prove these relations, one formally considers a field Φ' with $N + \delta N$ particles and determines in two different ways the quadratic expansion of $\mathcal{H}_{N+\delta N}(\Lambda', \Lambda'^*)$ in powers of Λ' and Λ'^* , where Λ' is up to a global phase as in (19) (written for $N + \delta N$ particles) the component of Φ' orthogonal to $\phi_0(N + \delta N)$. First, one simply replaces N with $N + \delta N$ and Λ with Λ' in (27), and then expands to first order in δN . The tensor $d\check{\mathcal{T}}_2/dN[N]$ naturally appears from this expansion. Second, one applies to $\mathcal{H}(\Phi', \Phi'^*)$ the expansion (25) around $\Phi_0(N)$ and takes into account the fact that, to first order in δN , the component of Φ' orthogonal to $\phi_0(N)$ contains, in addition to $\Lambda'_\perp$ coming from Λ' , a contribution coming from $d\phi_0/dN$:

$$\Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta N \left(\frac{N}{2}\right)^{1/2} \frac{d\phi_0}{dN}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \Lambda'_\perp(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + O(\delta N^2, \|\Lambda'\|^3, \delta N \|\Lambda'\|^2) \quad (33)$$

This infinitesimal shift proportional to δN along the direction of $d\phi_0/dN$ is responsible for the occurrence of the operator $\mathcal{D}$. Equations (31) and (32) are finally obtained by identification of the two resulting expressions of $\mathcal{H}_{N+\delta N}(\Lambda', \Lambda'^*)$ respectively to first and second order in Λ' and Λ'^* .

It remains to combine equations (26), (29), (31), and (32) after a coarse grained temporal average (over a time scale much longer than the oscillation period of the modal amplitudes b_α but much shorter than the evolution time of the quasiparticle numbers $|b_\alpha|^2$), to obtain

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\overline{\theta}}{dt} = \mu_0(N) + \overline{\frac{d\check{\mathcal{T}}_2}{dN}[N](\Lambda, \Lambda^*)} + O(\|\Lambda\|^3) \quad (34)$$

where we used the crucial property that $\overline{d\Lambda/dt}$ vanishes (and so does $\overline{dY/dt}$), since the range of variation of the field Λ is bounded. The quadratic form $\check{\mathcal{T}}_2[N]$ is represented by the matrix $\eta\mathcal{L}[N]$ with $\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, using a block notation and the hermitian scalar product $\langle, \rangle$ generating the norm $\|\cdot\|$:

$$\check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) = \frac{1}{2} \left\langle (\Lambda, \Lambda^*), \eta\mathcal{L}[N] \begin{pmatrix} \Lambda \\ \Lambda^* \end{pmatrix} \right\rangle \quad (35)$$

Then one inserts the modal decomposition (20) in the derivative with respect to N of the equation (35); we recall that ϵ_α and (u_α, v_α) , $-\epsilon_\alpha$ and (v_α^*, u_α^*) are the eigenvalues and the eigenvectors of $\mathcal{L}$. The coarse grained temporal average $\overline{}$ removes the crossed terms, and the Hellmann-Feynman theorem ensures that¹⁸ $\langle (u_\alpha, -v_\alpha), \frac{d\mathcal{L}[N]}{dN} \begin{pmatrix} u_\alpha \\ v_\alpha \end{pmatrix} \rangle = d\epsilon_\alpha/dN$, and finally leads to equation (21).

18. $(u_\alpha, -v_\alpha)$ is the dual vector of (u_α, v_α) because $(\eta\mathcal{L})^\dagger = \eta\mathcal{L}$.

Appendix B. Irrotational quantum hydrodynamics

In this supplementary section we give an additional derivation of equation (8) based on quantum hydrodynamics. Although this derivation is not microscopic contrarily to the one presented in the main text of the paper and in appendix A, and although it neglects the internal fermionic degrees of freedom treating the pairs of fermions at large spatial scales as a bosonic field, it has the advantage of relying only on the equation of state and thus of being valid in all interaction regimes.

To calculate the viscosity of superfluid helium at low temperature, Landau and Khalatnikov have developed in 1949 the theory of quantum hydrodynamics [22]. It allows one to determine, to leading order in T , the effect of a non-zero temperature on the quantum fluid, at least on the observables that only involve low energy scales and large length scales. Remarkably, the only specific ingredient is the zero-temperature equation of state of the fluid, which is here the energy per unit volume $e_0(\rho)$ of the ground state of the spatially homogeneous system of density ρ .

To obtain the time derivative of the phase operator of the condensate of fermion pairs, we refine the theory in two ways: by regularizing ultraviolet divergences and by specializing to the irrotational case.

First, we solve the issue of the Landau-Khalatnikov Hamiltonian ground state energy, that diverges due to the zero-point motion of the system eigenmodes. We discretize the space in a cubic lattice of spacing l , a sub-multiple of the size L of the quantization volume, which is much smaller than the typical wavelength $2\pi/q_{\text{th}}$ of the thermal excitations of the fluid but much larger than the mean interparticle distance $\rho^{-1/3}$,

$$\rho^{-1/3} \ll l \ll q_{\text{th}}^{-1} \quad (36)$$

both conditions being compatible at sufficiently low temperature. This is in the spirit of the validity range of hydrodynamics, which relies on a spatial coarse graining, and it provides a natural cut-off for the wave vectors $\mathbf{q}$ by restricting them to the first Brillouin zone¹⁹ $\mathcal{D} = [-\pi/l, \pi/l]^3$. In the Hamiltonian one must then replace the differential operators such as the gradient, the divergence and the Laplacian, by their discrete versions, as we shall implicitly do below, and introduce the *bare* energy density $e_{0,0}(\rho)$, which depends on the lattice spacing l . Following the ideas of renormalization, the zero-point energy of the modes, that formally diverges when $l \rightarrow 0$, adds up to $e_{0,0}(\rho)$ to exactly reconstruct the *effective* or *true* energy density $e_0(\rho)$, that does not depend on l and is what is measured experimentally.

Second, we specialize the theory to the case of an irrotational velocity field operator $\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{r}, t)$ that can then be written as the gradient of the phase field operator $\hat{\phi}(\mathbf{r}, t)$, itself canonically conjugate to the density field operator $\hat{\rho}(\mathbf{r}, t)$:

$$\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hbar}{m} \text{grad} \hat{\phi}(\mathbf{r}, t) \quad \text{with} \quad [\hat{\rho}(\mathbf{r}, t), \hat{\phi}(\mathbf{r}', t)] = i \frac{\delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'}}{l^3} \quad (37)$$

This amounts to neglecting the transverse component of the field $\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{r}, t)$, as done in reference [22] to determine the phonon-phonon interaction and go forward in the computation of viscosity. In the particular scale invariant case of the unitary Fermi gas, this was justified within the effective field theory in reference [35]. We note *en passant* that the density of fermionic quasiparticles is exponentially small in $1/T$ and is directly omitted by hydrodynamic theory.

The steps that follow are rather usual. One starts from the equations of motion of the fields in Heisenberg picture, that is the quantum continuity equation and the quantum Euler equation for the potential (whose gradient gives the quantum Euler equation for the velocity):

$$\partial_t \hat{\rho} + \text{div} \left[\frac{1}{2} \{\hat{\rho}, \hat{\mathbf{v}}\} \right] = 0 \quad (38)$$

$$\hbar \partial_t \hat{\phi} = -\frac{1}{2} m \hat{\mathbf{v}}^2 - \mu_{0,0}(\hat{\rho}) \quad (39)$$

where $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$ is the anticommutator of two operators and

$$\mu_{0,0}(\rho) = \frac{d}{d\rho} e_{0,0}(\rho) = e'_{0,0}(\rho) \quad (40)$$

¹⁹ We also require that the elementary excitations of the system remain phononic over the whole domain $\mathcal{D}$. This imposes $\hbar c/l < \Delta$ so $mcl/\hbar > mc^2/\Delta \gg 1$ in the BCS limit, and only $mcl/\hbar > 1$ elsewhere, where c is the sound velocity and Δ the gap at $T = 0$. The necessary condition $mcl/\hbar > 1$ is weaker than the already assumed one, $\rho^{1/3}l \gg 1$, in the strongly interacting regime or in the BCS limit, since c is then of the order of the Fermi velocity. It is more stringent and must be added explicitly in the so-called BEC limit, where the fermion pairs can be considered as bosons and form a weakly interacting condensate.

is the bare ground state chemical potential at density ρ . These equations originate from the Hamiltonian

$$\hat{H}_{\text{hydro}} = l^3 \sum_{\mathbf{r}} \left[\frac{1}{2} m \hat{\mathbf{v}} \cdot \hat{\rho} \hat{\mathbf{v}} + e_{0,0}(\hat{\rho}) \right] \quad (41)$$

The quantum spatial density and phase fluctuations are weak provided that $\rho^{1/3}l$ is large enough; the thermal ones are weak if in addition $q_{\text{th}}l$ is small enough.²⁰ Under these conditions one can linearize as in [22] the equations of motion around the spatially uniform solution:

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}, t) = \hat{\rho}_0 + \delta\hat{\rho}(\mathbf{r}, t) \quad (42)$$

$$\hat{\phi}(\mathbf{r}, t) = \hat{\phi}_0(t) + \delta\hat{\phi}(\mathbf{r}, t) \quad (43)$$

The operator $\hat{\rho}_0$ reduces to $\hat{N}/L^3$, where $\hat{N}$ is the operator giving the total number of particles, and is a constant of motion. The operator $\hat{\phi}_0$ is the phase operator of the condensate; one has here

$$\hat{\phi}_0 = \hat{\theta}_0/2 \quad (44)$$

since the phase operator $\hat{\theta}_0$ in equation (2) takes the pairs as the building block, whereas equations (38,39) are build on the fermionic particles. The spatial fluctuations $\delta\hat{\rho}$ and $\delta\hat{\phi}$, of vanishing (discrete) integral over the whole space, can be expanded on the plane waves of non-zero wave vector $\mathbf{q}$, and commute with $\hat{\rho}_0$. One solves the linearized equations for $\delta\hat{\rho}$ and $\delta\hat{\phi}$ and one can use the usual expansion on eigenmodes:

$$\delta\hat{\rho}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hat{\rho}_0^{1/2}}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{q} \in \frac{2\pi}{L} \mathbb{Z}^{3*} \cap \mathcal{D}} \left(\frac{\hbar q}{2m\hat{c}_{0,0}} \right)^{1/2} (\hat{B}_{\mathbf{q}} + \hat{B}_{-\mathbf{q}}^\dagger) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \quad (45)$$

$$\delta\hat{\phi}(\mathbf{r}, t) = \frac{-i}{\hat{\rho}_0^{1/2} L^{3/2}} \sum_{\mathbf{q} \in \frac{2\pi}{L} \mathbb{Z}^{3*} \cap \mathcal{D}} \left(\frac{m\hat{c}_{0,0}}{2\hbar q} \right)^{1/2} (\hat{B}_{\mathbf{q}} - \hat{B}_{-\mathbf{q}}^\dagger) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \quad (46)$$

where the creation operator $\hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger$ and the annihilation operator $\hat{B}_{\mathbf{q}}$ of a phonon with wave vector $\mathbf{q}$ and energy $\hbar q \hat{c}_{0,0}$ obey bosonic commutation relations $[\hat{B}_{\mathbf{q}}, \hat{B}_{\mathbf{q}'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'}$ and where we introduced the zero-temperature bare sound velocity operator

$$\hat{c}_{0,0} \equiv \left(\frac{\hat{\rho}_0 \mu'_{0,0}(\hat{\rho}_0)}{m} \right)^{1/2} \quad (47)$$

It remains to expand the right-hand side of (39) up to second order in $\delta\hat{\rho}$ and $\delta\hat{\phi}$, to extract the zero wave vector Fourier component, to perform a coarse grained temporal average to get rid of the oscillating crossed terms $\hat{B}_{\mathbf{q}} \hat{B}_{-\mathbf{q}}$ and $\hat{B}_{-\mathbf{q}}^\dagger \hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger$, and to use the identity

$$\frac{d}{d\rho} [\rho \mu'_{0,0}(\rho)]^{1/2} = \frac{\mu'_{0,0}(\rho) + \rho \mu''_{0,0}(\rho)}{2[\rho \mu'_{0,0}(\rho)]^{1/2}} \quad (48)$$

to obtain

$$\overline{\hbar \frac{d}{dt} \hat{\phi}_0} = -\mu_{0,0}(\hat{\rho}_0) - \sum_{\mathbf{q} \in \frac{2\pi}{L} \mathbb{Z}^{3*} \cap \mathcal{D}} \left(\hbar q \frac{d}{d\hat{N}} \hat{c}_{0,0} \right) \left(\hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{B}_{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \right) \quad (49)$$

At this order of the expansion, one can collect in (49) the zero-point contribution of the modes (the term 1/2 in between parentheses) and the bare chemical potential $\mu_{0,0}(\hat{\rho}_0)$ to form the true chemical potential $\mu_0(\hat{\rho}_0)$ of the fluid at zero temperature, and one can identify $\hat{c}_{0,0}$ in the prefactor of the phonon number operator $\hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{B}_{\mathbf{q}}$ with the true sound velocity at zero temperature, $\hat{c}_0 \equiv [\hat{\rho}_0 \mu'_0(\hat{\rho}_0)/m]^{1/2}$. One then obtains the (low temperature) phononic limit of relation (8), without any constraint on the interaction strength.

20. One first checks that the density fluctuations on a given lattice site are small in relative value, using (45). At $T = 0$, $\langle \delta\hat{\rho}^2 \rangle / \rho^2 \approx \frac{\hbar}{mcl} \frac{1}{\rho l^3} \ll 1$, using (36) and the necessary condition $mcl/\hbar > 1$ established in note 19. At $T > 0$, there is the additional thermal contribution $\approx \frac{\hbar}{mcl} \frac{(q_{\text{th}} l)^4}{\rho l^3}$ which is $\ll 1$ for the same reasons. Second, one checks that the phase fluctuations between two neighboring lattice sites are small in absolute value. To this end, one notes from (46) that $l^2 \langle (\mathbf{grad} \delta\hat{\phi})^2 \rangle = (mcl/\hbar)^2 \langle \delta\hat{\rho}^2 \rangle / \rho^2$. To conclude, it remains to use $mc/(\hbar \rho^{1/3}) = O(1)$, a property that holds in the whole BEC-BCS crossover, as well as the previous estimates of $\langle \delta\hat{\rho}^2 \rangle / \rho^2$.

References

- [1] M. Greiner, O. Mandel, T. W. Hänsch, I. Bloch, *Nature* 419 (2002) 51.
- [2] J. Estève, C. Gross, A. Weller, S. Giovanazzi, M. K. Oberthaler, *Nature* 455 (2008) 1216.
- [3] M. F. Riedel, P. Böhi, Yun Li, T. W. Hänsch, A. Sinatra, P. Treutlein, *Nature* 464 (2010) 1170.
- [4] G.-B. Jo, Y. Shin, S. Will, T. A. Pasquini, M. Saba, W. Ketterle, D. E. Pritchard, M. Vengalattore, M. Prentiss, *Phys. Rev. Lett.* 98 (2007) 030407.
- [5] M. Egorov, R. P. Anderson, V. Ivannikov, B. Opanchuk, P. Drummond, B. V. Hall, A. I. Sidorov, *Phys. Rev. A* 84 (2011) 021605.
- [6] T. Berrada, S. van Frank, R. Bücker, T. Schumm, J.-F. Schaff, J. Schmiedmayer, *Nature Communications* 4 (2013) 2077.
- [7] S. Nascimbène, N. Navon, K. J. Jiang, F. Chevy, C. Salomon, *Nature* 463 (2010) 1057.
- [8] M. J. H. Ku, A. T. Sommer, L. W. Cheuk, M. W. Zwierlein, *Science* 335 (2012) 563.
- [9] C. Kohstall, S. Riedl, E. R. Sánchez Guajardo, L. A. Sidorenkov, J. Hecker Denschlag, R. Grimm, *New Journal of Physics* 13 (2011) 065027.
- [10] I. Carusotto, Y. Castin, *Phys. Rev. Lett.* 94 (2005) 223202.
- [11] H. Kurkjian, Y. Castin, A. Sinatra, *Phys. Rev. A* 88 (2013) 063623.
- [12] A. Sinatra, Y. Castin, E. Witkowska, *Phys. Rev. A* 75 (2007) 033616.
- [13] A. B. Kuklov, J. L. Birman, *Phys. Rev. A* 63 (2000) 013609.
- [14] P. Anderson, *Phys. Rev.* 112 (1958) 1900.
- [15] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg, *Processus d’interaction entre photons et atomes*, InterEditions et Éditions du CNRS, Paris (1988).
- [16] A. J. Leggett, *Quantum Liquids*, Oxford University Press, Oxford (2006).
- [17] M. Rigol, V. Dunjko, M. Olshanii, *Nature* 452 (2008) 854.
- [18] A. Sinatra, Y. Castin, E. Witkowska, *Phys. Rev. A* 80 (2009) 033614.
- [19] J.-P. Blaizot, G. Ripka, *Quantum Theory of Finite Systems*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts (1985).
- [20] Y. Castin, R. Dum, *Phys. Rev. A* 57 (1998) 3008.
- [21] R. Combescot, M. Yu. Kagan, S. Stringari, *Phys. Rev. A* 74 (2006) 042717.
- [22] L. Landau, I. Khalatnikov, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* 19 (1949) 637.
- [23] M. Bartenstein, A. Altmeyer, S. Riedl, S. Jochim, C. Chin, J. Hecker Denschlag, R. Grimm, *Phys. Rev. Lett.* 92 (2004) 120401.
- [24] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, I. Bloch, *Nature* 415 (2002) 39.
- [25] W. S. Bakr, J. I. Gillen, A. Peng, S. Fölling, M. Greiner, *Nature* 462 (2009) 74.
- [26] Y. Castin, A. Sinatra, chapter “Spatial and Temporal Coherence of a Bose-condensed Gas” dans *Physics of Quantum fluids: New Trends and Hot Topics in Atomic and Polariton Condensates*, A. Bramati, M. Modugno (éditeurs), Springer, Berlin (2013).
- [27] A. L. Gaunt, T. F. Schmidutz, I. Gotlibovych, R. P. Smith, Z. Hadzibabic, *Phys. Rev. Lett.* 110 (2013) 200406.
- [28] A. Bulgac, J. E. Drut, P. Magierski, *Phys. Rev. Lett.* 96 (2006) 090404.
- [29] Y. Nishida, D. T. Son, *Phys. Rev. Lett.* 97 (2006) 050403.
- [30] A. Schirotzek, Yong-il Shin, C. H. Schunck, W. Ketterle, *Phys. Rev. Lett.* 101 (2008) 140403.
- [31] Y. Castin, I. Ferrier-Barbut, C. Salomon, *C. R. Physique* 16 (2015) 241.
- [32] G. Bighin, L. Salasnich, P. A. Marchetti, F. Toigo, *Phys. Rev. A* 92 (2015) 023638.
- [33] S. N. Klimin, J. Tempere, Jeroen P. A. Devreese, J. Low. Temp. Phys. 165 (2011) 261.
- [34] H. Kurkjian, Y. Castin, A. Sinatra, *Phys. Rev. A* 93 (2016) 013623.
- [35] D. T. Son, M. Wingate, *Ann. Physics* 321 (2006) 197.

Brouillage thermique d'un gaz cohérent de fermions

Thermal blurring of a coherent Fermi gas

Hadrien Kurkjian, Yvan Castin, Alice Sinatra

Laboratoire Kastler Brossel, ENS-PSL, CNRS, UPMC-Sorbonne Universités et Collège de France, Paris, France

Résumé

On considère généralement que la fonction d'onde macroscopique décrivant un condensat de paires de fermions possède une phase parfaitement définie et immuable. En réalité, il n'existe que des systèmes de taille finie, préparés, qui plus est, à température non nulle; le condensat possède alors un temps de cohérence fini, même lorsque le système demeure isolé tout au long de son évolution et que le nombre de particules N est fixé. La mémoire de la phase initiale se perd à mesure que le condensat interagit avec les modes excités, qui agissent comme un environnement déphasant. Cet effet fondamental, crucial pour les applications qui exploitent la cohérence macroscopique du condensat de paires, reste très peu étudié. Dans cet article, nous relient le temps de cohérence à la dynamique de phase du condensat, et nous montrons par une approche microscopique que la dérivée de l'opérateur phase du condensat $\hat{\theta}_0$ par rapport au temps est proportionnelle à un opérateur potentiel chimique que nous construisons, et qui inclut les deux branches d'excitations du gaz, tant par brisure des paires que par mise en mouvement de leur centre de masse. Pour une réalisation donnée d'énergie E , $\hat{\theta}_0$ évolue aux temps longs comme $-2\mu_{\text{mc}}(E)t/\hbar$ où $\mu_{\text{mc}}(E)$ est le potentiel chimique microcanonique; les fluctuations de l'énergie d'une réalisation à l'autre conduisent alors à un brouillage balistique de la phase, et à une décroissance gaussienne de la fonction de cohérence temporelle avec un temps caractéristique $\propto N^{1/2}$. En revanche, en l'absence de fluctuations d'énergie, le temps de cohérence diverge linéairement en N à cause du mouvement diffusif de $\hat{\theta}_0$. Enfin, nous proposons une méthode permettant de mesurer avec un gaz d'atomes froids ce temps de cohérence, que nous prédisons être de l'ordre de la dizaine de millisecondes pour un gaz de fermions préparé dans l'ensemble canonique à la limite unitaire.

Mots-clés : gaz de fermions; fluides quantiques; cohérence quantique; atomes froids

1. Position du problème

Les gaz cohérents d'atomes froids dans des pièges immatériels non dissipatifs sont des exemples uniques de systèmes quantiques macroscopiques isolés. Se pose alors le problème de leur temps de cohérence intrinsèque. Cette question fondamentale présente également un intérêt pratique, pour toutes les applications qui mettent à profit la cohérence macroscopique, par exemple en interférométrie ou en ingénierie quantique où l'on crée des états intriqués non triviaux par évolution cohérente [1, 2, 3]. Des mesures de temps de cohérence sont déjà accessibles avec des gaz de bosons [4, 5, 6]. Les expériences sur les gaz de fermions, qui se sont pour l'instant concentrées sur les propriétés thermodynamiques [7, 8], donc sur les aspects traditionnels du problème à N corps, commencent à s'intéresser aux mesures de corrélations et de cohérence [9], ce qui ouvrira un nouveau domaine de recherche, y compris dans le régime d'interaction forte : l'optique quantique fermionique [10]. Cependant, il n'y a à ce jour aucune prédiction sur le temps de cohérence d'un condensat de paires de fermions, sauf à température nulle [11]. Dans cet article nous présentons la première théorie microscopique permettant de combler ce vide théorique en toute généralité. Notre analyse vaut pour d'autres systèmes physiques, tels que les jonctions de Josephson mésoscopiques, pourvu qu'on arrive à réduire suffisamment la décohérence due à l'environnement.

Pour un gaz de bosons condensé, le temps de cohérence est déterminé par l'étalement de la distribution de probabilité du changement de phase du condensat pendant t . À température nulle et en présence d'interactions, cet étalement, balistique, est dû aux fluctuations du nombre de particules. Cet effet a été observé par interférence de deux condensats initialement cohérents, dont le nombre de particules fluctue du fait du bruit de partition [4, 6]. Contrairement au cas du laser, qui est un système quantique ouvert, et de façon inattendue, un étalement balistique de la phase subsiste dans

ces systèmes isolés pour un nombre de particules fixé si le gaz est à température non nulle [12, 13], les fluctuations de cette autre quantité conservée qu'est l'énergie remplaçant celles du nombre de particules.

Dans le cas d'un gaz non polarisé de fermions condensés par paires, l'étude du temps de cohérence présuppose une définition claire de la phase du condensat, et une construction explicite de l'opérateur $\hat{\theta}_0$ correspondant [11]. À température non nulle elle requiert en outre de pouvoir inclure dans la vitesse de variation de la phase la contribution des deux branches d'excitation, celle fermionique (par brisure des paires) et celle bosonique (par excitation du centre de masse des paires). Pour la branche fermionique, la RPA d'Anderson [14] suffit. Pour la branche bosonique en revanche, nous avons besoin d'un équivalent pour les fermions de la méthode de Bogolioubov permettant de construire les opérateurs de création $\hat{b}_\alpha^\dagger$ et d'annihilation $\hat{b}_\alpha$ de quasi-particules et d'exprimer $d\hat{\theta}_0/dt$ en termes de ces opérateurs. Qui plus est, il faut prendre en compte les interactions entre les quasi-particules dans l'évolution des $\hat{b}_\alpha$. Ceci est une conséquence non évidente du fait que la fonction d'onde du condensat de paires dépend du nombre total de particules N , même dans un système spatialement homogène, et va au-delà du programme de la RPA.

2. Décroissance de la fonction de cohérence

Aux températures inférieures à la température critique, la fonction de cohérence temporelle du champ de paires $\hat{\psi}_\downarrow(\mathbf{r})\hat{\psi}_\uparrow(\mathbf{r}')$, où $\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r})$ est l'opérateur champ fermionique pour la composante de spin σ , est dominée aux temps longs par celle du condensat :

$$g_1(t) = \langle \hat{a}_0^\dagger(t) \hat{a}_0(0) \rangle \quad (1)$$

où $\hat{a}_0 = \int d^3r d^3r' \varphi_0^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{\psi}_\downarrow(\mathbf{r}) \hat{\psi}_\uparrow(\mathbf{r}')$ est la composante du champ de paires sur la fonction d'onde du condensat [11]. Comme le système à l'équilibre est dans un mélange statistique d'états propres à N corps $|\psi_\lambda\rangle$, avec des poids Π_λ , nous sommes ramenés à l'étude de la fonction de cohérence $g_1^\lambda(t)$ dans l'état propre $|\psi_\lambda\rangle$, d'énergie E_λ et de nombre de particules N_λ . Pour tirer parti des faibles fluctuations relatives du nombre de paires condensées pour un grand système, on utilise la décomposition [11] en les opérateurs hermitiens phase et module

$$\hat{a}_0 = e^{i\hat{\theta}_0} \hat{N}_0^{1/2}, \quad (2)$$

et on approxime $\hat{N}_0$, opérateur nombre de paires condensées, par sa valeur moyenne $\bar{N}_0$ dans l'état d'équilibre du système, pour obtenir

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 e^{iE_\lambda t/\hbar} \langle \psi_\lambda | e^{-i(\hat{H} + \hat{W})t/\hbar} | \psi_\lambda \rangle \quad (3)$$

où l'opérateur $\hat{W}$, différence entre le transformé de $\hat{H}$ par $e^{i\hat{\theta}_0}$ et $\hat{H}$,

$$\hat{W} = e^{-i\hat{\theta}_0} \hat{H} e^{i\hat{\theta}_0} - \hat{H} = -i[\hat{\theta}_0, \hat{H}] - \frac{1}{2}[\hat{\theta}_0, [\hat{\theta}_0, \hat{H}]] + \dots \quad (4)$$

est approximativement N fois plus petit que $\hat{H}$. En effet, comme $\hat{a}_0$, $e^{i\hat{\theta}_0}$ change le nombre total de particules d'un $O(N^0)$. Alors que $\hat{H}$ est une observable extensive, $\hat{W}$ est un opérateur intensif et le double commutateur dans (4) est d'ordre $1/N$. Il apparaît formellement dans l'équation (3) un opérateur d'évolution correspondant au hamiltonien $\hat{H}$ perturbé par $\hat{W}$, restreint à l'état propre $|\psi_\lambda\rangle$ de $\hat{H}$. La fonction $g_1^\lambda/\bar{N}_0$ est donc, à un facteur de phase près, proportionnelle à l'amplitude de probabilité que le système initialement préparé dans $|\psi_\lambda\rangle$ y soit encore au bout d'un temps t en présence de $\hat{W}$. Une approche naturelle pour obtenir une approximation non perturbative de cette amplitude est celle des fonctions de Green ou de l'opérateur résolvante $\hat{G}(z) = (z\hat{1} - (\hat{H} + \hat{W}))^{-1}$ du hamiltonien perturbé. Par la méthode des projecteurs (voir la sous-section §III.B.2 de la référence [15]), on définit un hamiltonien effectif non hermitien $\hat{H}_{\text{eff}}(z)$ gouvernant l'évolution restreinte à $|\psi_\lambda\rangle$, donc tel que $\langle \psi_\lambda | \hat{G}(z) | \psi_\lambda \rangle = (z - \langle \psi_\lambda | \hat{H}_{\text{eff}}(z) | \psi_\lambda \rangle)^{-1}$. Ceci conduit à

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 \int_C \frac{dz}{2i\pi} \frac{e^{-i(z-E_\lambda)t/\hbar}}{z - \langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda} \quad \text{avec} \quad \langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda = E_\lambda + \langle \hat{W} \rangle_\lambda + \langle \hat{W} \hat{Q}_\lambda \frac{\hat{Q}_\lambda}{z\hat{Q}_\lambda - \hat{Q}_\lambda(\hat{H} + \hat{W})\hat{Q}_\lambda} \hat{Q}_\lambda \hat{W} \rangle_\lambda \quad (5)$$

Le domaine d'intégration C dans le plan complexe est toute droite $z = x + i\eta$, $\eta > 0$ fixé, décrite dans le sens des réels x décroissant de $+\infty$ à $-\infty$, et l'on a introduit la notation $\langle \hat{A} \rangle_\lambda \equiv \langle \psi_\lambda | \hat{A} | \psi_\lambda \rangle$ et l'opérateur $\hat{Q}_\lambda = \hat{1} - |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$, projecteur

orthogonal à $|\psi_\lambda\rangle$. En se limitant dans $\langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda$ à l'ordre deux en $\hat{W}$, donc en omettant $\hat{Q}_\lambda \hat{W} \hat{Q}_\lambda$ au dénominateur, et en négligeant sa dépendance en z (approximation du pôle), $\langle \hat{H}_{\text{eff}}(z) \rangle_\lambda \approx \langle \hat{H}_{\text{eff}}(E_\lambda + i0^+) \rangle_\lambda$, on obtient^{1 2}

$$g_1^\lambda(t) \simeq \bar{N}_0 e^{-i\langle \hat{W} \rangle_\lambda t / \hbar} e^{-(i\delta_\lambda + \gamma_\lambda)t} \quad \text{avec} \quad \hbar(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda) = \langle \hat{W} \hat{Q}_\lambda \frac{\hat{Q}_\lambda}{(E_\lambda + i0^+) \hat{Q}_\lambda - \hat{Q}_\lambda \hat{H} \hat{Q}_\lambda} \hat{Q}_\lambda \hat{W} \rangle_\lambda \quad (6)$$

On notera que $2\gamma_\lambda$ n'est autre que le taux de départ de l'état $|\psi_\lambda\rangle$ induit par $\hat{W}$ tel que le prédit la règle d'or de Fermi.

Le terme dominant sous l'exponentielle dans (6) est $\langle \hat{W} \rangle_\lambda$, d'ordre N^0 comme $\hat{W}$. Afin de l'interpréter, on constate d'abord que, d'après le développement (4), en point de vue de Heisenberg,

$$\hat{W}(t) = \hbar \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (7)$$

À ce stade il pourrait sembler difficile d'obtenir une expression explicite de $d\hat{\theta}_0/dt$ qui permettrait d'aller au-delà d'une description purement formelle de la dynamique de phase. Heureusement il n'en est rien car, comme nous le montrerons dans la section suivante, la moyenne temporelle à gros grains de $d\hat{\theta}_0/dt$ dans un gaz faiblement excité est proportionnelle à un opérateur potentiel chimique, quantité thermodynamique par nature :

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} = \mu_0(\hat{N}) + \sum_{s=F,B} \sum_{\alpha} \frac{d\epsilon_{s,\alpha}}{dN} \hat{n}_{s,\alpha} \quad (8)$$

La somme au second membre porte sur les deux branches d'excitation, celle des quasi-particules fermioniques (α inclut un indice de spin et un indice orbital, $\alpha = \mathbf{k}, \sigma$ pour un système spatialement homogène) qui présente une bande interdite, et celle des quasi-particules bosoniques (α est uniquement orbital, $\alpha = \mathbf{q}$ dans l'exemple précédent) dont le départ, à la limite thermodynamique et pour un système homogène, est phononique. Lorsque nous disons que le gaz doit être faiblement excité, nous voulons dire que la déplétion thermique du condensat doit rester petite. Ceci suppose en particulier que le nombre moyen de quasi-particules soit une faible fraction du nombre total de particules. La moyenne temporelle à gros grains est prise sur un temps long devant l'inverse des pulsations propres $\epsilon_{s,\alpha}/\hbar$ de ces quasi-particules mais court devant leur temps de collision, c'est-à-dire le temps typique de variation des opérateurs

1. Il y a derrière l'approximation du pôle l'hypothèse que le continuum auquel $|\psi_\lambda\rangle$ est couplé est large en fréquence [15]. Aussi la loi exponentielle dans (6) ne vaut-elle qu'aux temps longs devant l'inverse de cette largeur, c'est-à-dire ici devant le temps de corrélation τ_c des quasi-particules introduit plus bas.

2. Pour faire apparaître une ligne de coupure dans la résolvante puis un pôle dans son prolongement analytique, donc pour justifier rigoureusement l'émergence d'une partie imaginaire γ_λ non nulle et donner un sens précis à l'équation (6), il faut passer à la limite thermodynamique ($N \rightarrow +\infty$ à densité fixée). Mais c'est ici inhabituellement subtil : comme le montre une généralisation du raisonnement autour de l'équation (10), la fonction déplacement [15] $\Delta_\lambda(z) \equiv \langle \hat{W} \hat{Q}_\lambda \frac{\hat{Q}_\lambda}{\hat{Q}_\lambda z + \hat{Q}_\lambda (E_\lambda - \hat{H}) \hat{Q}_\lambda} \hat{Q}_\lambda \hat{W} \rangle_\lambda$, avec $\text{Im } z > 0$, tend vers zéro en $1/N$, tout comme $\delta_\lambda - i\gamma_\lambda$ dans (6). L'astuce consiste alors à se placer à une échelle de temps d'ordre N , en posant $t = N\tau$ et en gardant τ fixé à la limite thermodynamique. On effectue le changement de variable $z = E_\lambda + \langle \hat{W} \rangle_\lambda + z'/N$ dans l'intégrale de (5), on choisit $\eta = \eta'/N$ ($\eta' > 0$ fixé) dans le domaine d'intégration $C = \{z = x + i\eta, x = +\infty \rightarrow -\infty\}$, ce qui conduit au domaine d'intégration $C' = \{z' = x' + i\eta', x' = +\infty \rightarrow -\infty\}$ sur z' , et l'on néglige le terme $\langle \hat{W} \rangle_\lambda$ qui apparaît au dénominateur de la fonction déplacement ainsi que $\text{Re } z'/N$ (par cohérence avec l'omission de $\hat{Q}_\lambda \hat{W} \hat{Q}_\lambda$). Le facteur $1/N$ dans l'élément d'intégration $dz = dz'/N$ permet de sortir un facteur $1/N$ au dénominateur de l'intégrande, et l'on obtient à la limite thermodynamique le résultat suivant, indépendant de η' par analyticit  de l'intégrande dans le demi-plan $\text{Im } z' > 0$:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{g_1^\lambda(t) e^{i\langle \hat{W} \rangle_\lambda t / \hbar}}{N_0} \simeq \int_{C'} \frac{dz'}{2i\pi} \frac{e^{-iz'\tau / \hbar}}{z' - \hbar\Omega_\lambda} = e^{-i\Omega_\lambda \tau} \quad \text{avec} \quad \hbar\Omega_\lambda = \lim_{N \rightarrow +\infty} N\Delta_\lambda(i\eta'/N)$$

Voilà qui fournit, pour un système de taille assez grande mais finie, la définition $N(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda) \equiv \Omega_\lambda$. Si l'on avait pris la limite thermodynamique à t fixé avant de faire tendre t vers l'infini, on serait tombé, en développant l'intégrande de (5) au premier ordre en la fonction déplacement, sur une autre définition : $\lim_{N \rightarrow +\infty} N[\bar{N}_0^{-1} g_1^\lambda(t) e^{i\langle \hat{W} \rangle_\lambda t / \hbar} - 1] \sim (-it)N(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda)$ avec $N(\delta_\lambda - i\gamma_\lambda) \equiv \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \lim_{N \rightarrow +\infty} N\Delta_\lambda(i\eta)$. Pour montrer l'équivalence de ces deux définitions, injectons dans la fonction déplacement une relation de fermeture sur les états propres de $\hat{H}$, $\Delta_\lambda(z) = \sum_{\mu \neq \lambda} \langle \psi_\mu | \hat{W} | \psi_\lambda \rangle^2 / (z + E_\lambda - E_\mu)$, et voyons si la granularité de la distribution des $E_\mu - E_\lambda$ dans cette somme pondérée tend vers zéro plus vite que η'/N . Pour cela, voyons chaque état propre comme la superposition cohérente d'un état de Fock central de phonons et d'un faible halo d'états de Fock de phonons s'en déduisant par des processus Beliaev-Landau 1 phonon $\leftrightarrow$ 2 phonons. Même si $\hat{W}$ conserve les nombres de phonons, cf. (8), il peut coupler l'état de Fock central de $|\psi_\mu\rangle$ au halo de $|\psi_\lambda\rangle$. Au pire, un seul processus Beliaev-Landau est mis en jeu, auquel cas $E_\mu - E_\lambda = \pm(\epsilon_{B,\mathbf{k}_1} + \epsilon_{B,\mathbf{k}_2} - \epsilon_{B,\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2})$, où $\mathbf{k}_1$ et $\mathbf{k}_2$ sont les vecteurs d'onde des deux phonons émis ou absorbés ; comme la paire $\{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\}$ prend $\propto V^2$ valeurs différentes, où V est le volume du système, $E_\mu - E_\lambda$ varie alors par pas $\propto 1/V^2$, ce qui est bien $\ll \eta'/N$.

nombre de quasi-particules $\hat{n}_{s,\alpha}$, ce qui suppose que ces quasi-particules sont dans le régime faiblement collisionnel. Enfin $\mu_0(N)$ est le potentiel chimique à température nulle du gaz non polarisé à N particules, autrement dit la dérivée de l'énergie du fondamental par rapport à N . Nous interprétons le deuxième terme du second membre de (8) comme un « opérateur potentiel chimique » au sens où sa moyenne quantique est la dérivée adiabatique, c'est-à-dire à populations des quasi-particules $\langle \hat{n}_{s,\alpha} \rangle$ fixées, de l'énergie des quasi-particules $\sum_{s=F,B} \sum_{\alpha} \epsilon_{s,\alpha} \langle \hat{n}_{s,\alpha} \rangle$ par rapport à N . L'équation (8) relie la dérivée de la phase au potentiel chimique au niveau des opérateurs quantiques d'une théorie microscopique multimode. De ce point de vue, elle va au-delà de la seconde relation de Josephson établie pour la phase du paramètre d'ordre d'un supraconducteur (cf. la section §3.4 de la référence [16]).

En prenant la moyenne de l'équation (8) dans $|\psi_{\lambda}\rangle$ et en utilisant l'hypothèse de thermicité des états propres [17] pour identifier moyenne dans un état propre et moyenne d'ensemble microcanonique, on fait donc apparaître le potentiel chimique microcanonique μ_{mc} à l'énergie E_{λ} et au nombre de particules N_{λ} :

$$\hbar \left\langle \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} \right\rangle_{\lambda} = -2\mu_{mc}(E_{\lambda}, N_{\lambda}) \quad (9)$$

Nous omettons la moyenne temporelle à gros grains, ici superflue puisque la moyenne quantique est prise dans un état stationnaire du système.

Le terme suivant sous l'exponentielle dans (6) est d'ordre N^{-1} donc sous-dominant. Pour le voir, on le relie à la fonction de corrélation temporelle de $d\hat{\theta}_0/dt$ dans l'état $|\psi_{\lambda}\rangle$. À une contribution d'ordre $1/N^2$ près :

$$\gamma_{\lambda} + i\delta_{\lambda} = \int_0^{+\infty} dt \left[\left\langle \frac{d\hat{\theta}_0(t)}{dt} \frac{d\hat{\theta}_0(0)}{dt} \right\rangle_{\lambda} - \left\langle \frac{d\hat{\theta}_0}{dt} \right\rangle_{\lambda}^2 \right] \quad (10)$$

qui redonne bien (6) après injection d'une relation de fermeture sur les états propres de $\hat{H}$. L'intégrande a comme valeur initiale $\text{Var}_{\lambda}(d\hat{\theta}_0/dt) = O(1/N)$ (ceci s'obtient en additionnant les variances des nombres de quasi-particules, ce qui correspond à un gaz parfait de quasi-particules dans l'ensemble canonique et surestime donc la variance microcanonique) et décroît sur le temps typique de corrélation τ_c des $\hat{n}_{s,\alpha}$, c'est-à-dire le temps typique de collision entre les quasi-particules. Ceci permet d'estimer $|\gamma_{\lambda} + i\delta_{\lambda}| \approx \tau_c \text{Var}(d\hat{\theta}_0/dt) = O(1/N)$. Le déplacement δ_{λ} est donc du même ordre en N que le terme sous-dominant $[\hat{\theta}_0, [\hat{\theta}_0, \hat{H}]]$ dans $\hat{W}$; tous deux sont N fois plus faibles que (9) et on les néglige pour un grand système. En revanche γ_{λ} est le seul à conduire à une décroissance exponentielle de la fonction de cohérence microcanonique $g_1^{\lambda}(t)$ et doit être conservé. L'équation (10) en fournit aussi une interprétation physique, si l'on se souvient que, dans la théorie du mouvement brownien, l'intégrale de la fonction de corrélation de la vitesse donne le coefficient de diffusion de la position : γ_{λ} n'est autre que le coefficient de diffusion de la phase du condensat de paires lorsque le système est préparé dans l'ensemble microcanonique correspondant à $|\psi_{\lambda}\rangle$, et sera désormais noté $\gamma_{\lambda} = D(E_{\lambda}, N_{\lambda})$. Nous retenons finalement :

$$g_1^{\lambda}(t) \simeq \bar{N}_0 e^{2i\mu_{mc}(E_{\lambda}, N_{\lambda})t/\hbar} e^{-D(E_{\lambda}, N_{\lambda})t} \quad (11)$$

L'équation (10) fournit même une méthode de calcul de D : si l'on dispose d'équations cinétiques pour les nombres de quasi-particules apparaissant dans $\overline{d\hat{\theta}_0/dt}^t$, voir l'équation (8), on peut calculer leur fonction de corrélation temporelle, comme il est fait dans la référence [18], et en déduire que

$$D(E, N) = -(P\vec{A}) \cdot M^{-1} C_{mc} P\vec{A} \quad (12)$$

La matrice M , de coefficients $M_{s\alpha, s'\alpha'}$, est la matrice des équations cinétiques linéarisées $\frac{d}{dt} \vec{\delta n} = M \vec{\delta n}$ donnant l'évolution des fluctuations $\delta n_{s,\alpha}$ des nombres de quasi-particules, regroupées en un vecteur $\vec{\delta n}$, autour de leurs valeurs stationnaires $\bar{n}_{s,\alpha}$. Pour définir les autres notations, on introduit comme dans [18] la matrice C_{can} des covariances des nombres de quasi-particules $\hat{n}_{s,\alpha}$ dans l'ensemble canonique à N particules et d'énergie moyenne E , le vecteur énergie $\vec{\epsilon}$ de composantes $\epsilon_{s,\alpha}$ et son vecteur dual $\vec{\epsilon} \propto C_{can} \vec{\epsilon}$ normalisé de façon que $\vec{\epsilon} \cdot \vec{\epsilon} = 1$.³ Alors le vecteur $\vec{A} = (2/\hbar) d\vec{\epsilon}/dN$

3. On a $(C_{can})_{s\alpha, s'\alpha'} = \delta_{s\alpha, s'\alpha'} \bar{n}_{s,\alpha} (1 \pm \bar{n}_{s,\alpha})$ et $\bar{n}_{s,\alpha} = 1/[\exp(\epsilon_{s,\alpha}/k_B T) \mp 1]$ où le signe supérieur (inférieur) vaut pour la branche d'excitation bosonique (fermionique). $\vec{\epsilon}$ et $\vec{\epsilon}$ sont des vecteurs propres à gauche et à droite de M avec la valeur propre nulle, comme le montrent la conservation de l'énergie et l'écriture plus parlante $\vec{\epsilon} \propto d\vec{n}/dT$, T étant la température de l'ensemble canonique et $\vec{n}$ le vecteur de composantes $\bar{n}_{s,\alpha}$ [18].

regroupe les coefficients des $\hat{n}_{s,\alpha}$ dans l'expression (8) de $-\overline{d\hat{\theta}_0/dt}$, la matrice P est le projecteur non orthogonal⁴ tel que $P\vec{\delta n} = \vec{\delta n} - \vec{\epsilon}(\vec{\epsilon} \cdot \vec{\delta n})$ pour tout $\vec{\delta n}$, et la matrice des covariances microcanonique vaut $C_{mc} = P^\dagger C_{can} P$ [18].

Il nous reste maintenant à prendre la moyenne statistique de l'équation (11) sur les états $|\psi_\lambda\rangle$ constituant l'état mélange du système. Aux grands N , on suppose que l'ensemble généralisé donné par les Π_λ conduit à des fluctuations de l'énergie totale et du nombre de particules très faibles en valeur relative autour de leur valeur moyenne $\bar{E}$ et de $\bar{N}$ (c'est le cas par exemple des ensembles canonique et grand canonique). On en prend donc une approximation gaussienne et on linéarise μ_{mc} autour de $(\bar{E}, \bar{N})$. À cet ordre, on peut remplacer D , déjà sous-dominant d'un facteur N , par $D(\bar{E}, \bar{N})$. Il n'y a plus qu'à calculer l'intégrale gaussienne du facteur de phase $\exp\{2i[(\partial\mu_{mc}(\bar{E}, \bar{N})/\partial E)(E - \bar{E}) + (\partial\mu_{mc}(\bar{E}, \bar{N})/\partial N)(N - \bar{N})]t/\hbar\}$ pour obtenir le résultat central de ce travail :

$$g_1(t) \simeq \bar{N}_0 e^{2i\mu_{mc}(\bar{E}, \bar{N})t/\hbar} e^{-t^2/2t_{br}^2} e^{-D(\bar{E}, \bar{N})t} \quad (13)$$

En présence de fluctuations de l'énergie ou du nombre de particules, le brouillage thermique aux temps longs prend la forme d'une décroissance gaussienne de la fonction de cohérence $g_1(t)$, avec un temps caractéristique

$$(2t_{br}/\hbar)^{-2} = \text{Var} \left(N \frac{\partial\mu_{mc}}{\partial N}(\bar{E}, \bar{N}) + E \frac{\partial\mu_{mc}}{\partial E}(\bar{E}, \bar{N}) \right) \quad (14)$$

qui diverge en $N^{1/2}$ pour des fluctuations normales. Le coefficient de diffusion de la phase D donne, quant à lui, un temps de décroissance caractéristique qui diverge linéairement en N ; c'est donc bien une contribution sous-dominante aux temps longs, sauf dans l'ensemble microcanonique où cette diffusion de phase intrinsèque peut être observée directement.

3. Dérivation microscopique de l'équation sur l'opérateur phase

Comme promis, nous donnons maintenant à notre connaissance la première démonstration microscopique de l'équation (8), reliant la vitesse de variation de l'opérateur phase d'un condensat de paires à ce que l'on peut qualifier d'opérateur potentiel chimique.

La contribution de la branche d'excitation fermionique à $d\hat{\theta}_0/dt$ peut s'obtenir par des équations du mouvement linéarisées pour de faibles fluctuations des opérateurs de paires $\hat{\psi}_\downarrow\hat{\psi}_\uparrow$, $\hat{\psi}_\uparrow^\dagger\hat{\psi}_\downarrow^\dagger$ et $\hat{\psi}_\sigma^\dagger\hat{\psi}_\sigma$ autour de l'état de champ moyen, ce qui constitue la Random Phase Approximation (RPA) d'Anderson [14]. En effet, en calculant la moyenne temporelle de $d\hat{\theta}_0/dt$ grâce à l'équation (120) de la référence [11] et en réécrivant l'équation (86) de cette référence en termes des nombres d'occupation des quasi-particules fermioniques,⁵ on obtient

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\bar{\theta}_0}{dt} \Big|_{\text{RPA}} = \mu(\bar{N}) + \frac{d\mu}{dN}(\bar{N} - \bar{N}) + \sum_{\alpha=\mathbf{k},\sigma} \frac{d\epsilon_{F,\alpha}}{dN} \hat{n}_{F,\alpha} \quad (15)$$

où $\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}$ est le spectre d'excitation BCS, ici pour un système spatialement homogène, et $\bar{N}$ le nombre moyen BCS de particules dans l'ensemble grand canonique de potentiel chimique μ .⁶

Des difficultés fondamentales nous empêchent d'obtenir la contribution de la branche de phonons à l'équation (8) dans le cadre de la RPA.⁷ Nous avons alors choisi de traiter le problème par une approche variationnelle avec comme

4. $P\vec{\epsilon} = \vec{0}$ et $P^\dagger$ projette sur le sous-espace des fluctuations $\vec{\delta n}$ d'énergie nulle, $\{\vec{\delta n} | \vec{\epsilon} \cdot \vec{\delta n} = 0\}$, à l'intérieur duquel l'inverse de M est défini.

5. On remarque que $\frac{\Delta_0}{\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}} \hat{\mathcal{L}}_{\mathbf{k}} = \hat{n}_{F,\mathbf{k},\uparrow} + \hat{n}_{F,-\mathbf{k},\downarrow}$ où le membre de gauche fait référence aux notations de l'article [11], et on se sert de son équation (74) pour reconnaître $d\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}/d\mu$.

6. L'équation (15) est écrite en réintroduisant le terme de phase trivial $-2\mu(\bar{N})t/\hbar$ qui n'apparaît pas dans la référence [11] du fait de l'utilisation du hamiltonien grand canonique.

7. Le résultat (15) restreint à l'ordre linéaire en les opérateurs de paires n'inclut pas la contribution de la branche de phonons. On pourrait espérer obtenir cette contribution en poussant le calcul par la RPA jusqu'à l'ordre quadratique comme suit : premièrement, on calcule $d\hat{\theta}_0/dt$ jusqu'à l'ordre quadratique. Deuxièmement, on forme l'ensemble des opérateurs de la RPA qui transfèrent une quantité de mouvement $\hbar\mathbf{q}$, à savoir $\hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q},\downarrow}\hat{a}_{\mathbf{k},\uparrow}$, $\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\uparrow}^\dagger\hat{a}_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger$, $\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\uparrow}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k},\uparrow}$ et $\hat{a}_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger\hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q},\downarrow}$, où $\hat{a}_{\mathbf{k},\uparrow}$ annihile un fermion de vecteur d'onde $\mathbf{k}$ et de spin $\uparrow$, ensemble qui est clos au regard des équations linéarisées. Pour chaque valeur de $\mathbf{q}$ la matrice $\mathcal{L}_{\mathbf{q}}$ de ce système d'équations possède deux modes collectifs, dont les énergies, opposées

Ansatz l'état cohérent de paires dépendant du temps le plus général⁸

$$|\psi\rangle = \mathcal{N}(t) \exp \left(b^6 \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \Gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t) \hat{\psi}_{\uparrow}^{\dagger}(\mathbf{r}) \hat{\psi}_{\downarrow}^{\dagger}(\mathbf{r}') \right) |0\rangle, \quad (16)$$

Cet Ansatz, fonction des variables indépendantes $\Gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ et normalisé à l'unité grâce au facteur $\mathcal{N}(t)$, est écrit ici après discrétisation de l'espace réel en un réseau cubique de pas l (que l'on fait tendre vers 0 à la fin des calculs), les opérateurs champ obéissant alors à des relations d'anticommutation du type $\{\hat{\psi}_{\sigma}(\mathbf{r}), \hat{\psi}_{\sigma'}^{\dagger}(\mathbf{r}')\} = \delta_{\sigma, \sigma'} \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} / l^3$. Le jeu de variables canoniquement conjuguées associé, $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, $\Phi^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ est construit⁹ dans la section §9.9b de la référence [19]. Il ne faut pas confondre le champ Φ avec le champ de paires $\langle \hat{\psi}_{\downarrow} \hat{\psi}_{\uparrow} \rangle$.¹⁰ Quand les paires de l'état (16) sont au repos, $\Gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}', t)$ dépend uniquement de $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$ et la transformée de Fourier de Φ n'est autre que l'amplitude BCS $V_{\mathbf{k}}$ de la paire $\mathbf{k} \uparrow, -\mathbf{k} \downarrow$ [11], tandis que la transformée de Fourier du champ de paires s'écrit $-U_{\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}} = -V_{\mathbf{k}}(1 - |V_{\mathbf{k}}|^2)^{1/2}$. Lorsque les paires sont en mouvement, nous n'avons plus d'interprétation physique simple mais la norme au carré de Φ demeure égale à la moitié du nombre moyen de particules dans l'état $|\psi\rangle$:

$$\frac{N}{2} = \|\Phi\|^2 \equiv l^6 \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} |\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t)|^2. \quad (17)$$

Le hamiltonien régissant l'évolution du champ Φ , à savoir

$$\mathcal{H}(\Phi, \Phi^*) = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \quad (18)$$

pourrait être explicité à l'aide du théorème de Wick, mais nous aurons ici besoin seulement de son invariance par changement de phase globale $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rightarrow e^{i\gamma} \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, $\forall \gamma \in \mathbb{R}$ (symétrie $U(1)$), qui découle de la conservation du nombre total de particules $\hat{N}$ par $\hat{H}$. À température nulle, le champ $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ à N fixé est figé, à une phase globale près, dans le minimiseur $\Phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (N/2)^{1/2} \phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ de $\mathcal{H}$, où ϕ_0 , réel et normalisé à l'unité, dépend de N même dans le cas spatialement homogène. ϕ_0 diffère de la fonction d'onde du condensat φ_0 de la même manière que Φ diffère du champ de paires $\langle \hat{\psi}_{\downarrow} \hat{\psi}_{\uparrow} \rangle$ (voir la note 10). À température suffisamment faible, on peut développer $\mathcal{H}$ en puissances des petites déviations de Φ par rapport au cercle $\gamma \mapsto e^{i\gamma} \Phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, lieu des minima de $\mathcal{H}$ à N fixé. On décompose donc le champ en ses composantes colinéaire et orthogonale à ϕ_0 :

$$\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = e^{i\theta} [n^{1/2} \phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] \quad (19)$$

l'une de l'autre, sont linéaires en $\mathbf{q}$ dans la limite des grandes longueurs d'onde. On développe alors les opérateurs de la RPA sur l'ensemble des modes propres de $\mathcal{L}_{\mathbf{q}}$; les amplitudes obtenues sur les modes collectifs, $\hat{b}_{-\mathbf{q}}$ et $\hat{b}_{\mathbf{q}}^{\dagger}$, annihilent et créent respectivement une excitation collective d'impulsion $\mp \hbar \mathbf{q}$. Troisièmement, on insère cette décomposition modale dans les opérateurs de la RPA apparaissant dans $d\hat{\theta}_0/dt$ pour obtenir une expression quadratique en les amplitudes modales, et donc des termes en $\hat{b}_{\mathbf{q}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{q}}$ comme dans (8). Malheureusement, cette approche par la RPA n'est pas fiable et nous devons y renoncer car les opérateurs de la RPA, bien que linéairement indépendants, ne sont pas quadratiquement indépendants, comme on le voit en dissociant et réassociant les opérateurs de paires grâce aux relations d'anticommutation fermioniques, par exemple

$$(\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow}^{\dagger})(\hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q}\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{-\mathbf{k}\downarrow}^{\dagger}) = (\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{-\mathbf{k}-\mathbf{q}\downarrow}^{\dagger})(\hat{a}_{-\mathbf{k}\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}\uparrow}^{\dagger}).$$

Ceci montre (i) qu'il n'y a pas une manière unique d'exprimer $d\hat{\theta}_0/dt$ comme une fonction quadratique des opérateurs de la RPA, (ii) que les amplitudes modales ne sont pas quadratiquement indépendantes, et (iii) que le coefficient de $\hat{b}_{\mathbf{q}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{q}}$ n'est pas déterminé de manière unique par cette approche fondée sur la RPA

8. Nous utilisons ici par souci de simplicité un Ansatz de type BCS dépendant du temps dans lequel le nombre de particules possède des fluctuations quantiques (à ne pas confondre avec les fluctuations thermiques de l'ensemble grand canonique). Au prix d'une difficulté supplémentaire, nous aurions pu tout aussi bien choisir un Ansatz à nombre de particules fixé [16], ce qui n'aurait changé les coefficients de la fonctionnelle énergie que d'une correction relative $O(N^{-1/2})$, si bien que le spectre obtenu à la limite thermodynamique eût été le même.

9. Nos variables Γ et Φ correspondent aux variables z et β de la référence [19] dans le cas où l'on remplace les opérateurs et le vide de quasi-particules dans l'équation (9.132) de [19] par ceux des particules. Si $\underline{\Gamma}$ et $\underline{\Phi}$ sont les matrices de coefficients respectivement $l^3 \Gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ et $l^3 \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ alors $\underline{\Phi} = -\underline{\Gamma}(1 + \underline{\Gamma}^{\dagger} \underline{\Gamma})^{-1/2}$, d'après l'équation (9.144) de [19]. Leurs équations d'évolution s'obtiennent par méthode variationnelle à partir du lagrangien $L = i\hbar [\langle \psi | (d/dt) | \psi \rangle - \text{c.c.}] / 2 - \langle \psi | H | \psi \rangle$. Φ a été choisi astucieusement de sorte que $L = i\hbar l^6 \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} [\Phi^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \partial_t \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - \text{c.c.}] / 2 - \mathcal{H}(\Phi, \Phi^*)$, ce qui conduit à $\partial_t \Phi = (i\hbar l^6)^{-1} \partial_{\Phi^*} \mathcal{H}$. Ceci montre que la variable conjuguée de Φ dans le formalisme hamiltonien est $i\hbar l^6 \Phi^*$ pour le crochet de Poisson traditionnel, et donc Φ^* pour le crochet de Poisson $\{\Phi, \Phi^*\} = (i\hbar l^6)^{-1}$, sachant qu'on doit avoir $\partial_t \Phi = \{\Phi, \mathcal{H}\}$.

10. Avec la même notation matricielle que dans la note 9, nous avons $\langle \hat{\psi}_{\uparrow} \hat{\psi}_{\downarrow} \rangle = \underline{\Phi}(1 - \underline{\Phi}^{\dagger} \underline{\Phi})^{1/2}$ d'après l'équation (9.146) de la référence [19].

où l'excursion de la phase θ peut être arbitrairement grande, contrairement à celle de Λ . Ce cadre permet de développer une théorie perturbative systématique en puissances du champ Λ (voir l'annexe A), qui est l'analogue pour les fermions de la théorie de Bogolioubov sans brisure de symétrie $U(1)$ pour les bosons [20]. Comme nous le verrons, la phase θ reste proche de la phase θ_0 du condensat si Λ est assez petit. On écrit donc les équations du mouvement pour θ et pour les champs de l'espace orthogonal Λ, Λ^* . Dans la forme finale des équations, on fait systématiquement disparaître les variables du condensat grâce à la relation $n = N/2 - \|\Lambda\|^2$, conséquence de (17), et on se limite à l'ordre 2 en Λ, Λ^* .

La difficulté centrale de notre problème provient de l'existence d'un terme linéaire en Λ, Λ^* dans $d\theta/dt$, conséquence de la dépendance de ϕ_0 en le nombre de paires [11]. En l'absence de ce terme linéaire, il suffirait de développer le champ Λ sur les modes propres de ses petites oscillations linéaires, déduits de l'approximation quadratique du hamiltonien $\mathcal{H}$ à N fixé :

$$\begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t) \\ \Lambda^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t) \end{pmatrix} = \sum_{\alpha} b_{\alpha}(t) \begin{pmatrix} u_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ v_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \end{pmatrix} + b_{\alpha}^*(t) \begin{pmatrix} v_{\alpha}^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ u_{\alpha}^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \end{pmatrix} \quad (20)$$

où la somme porte sur les modes propres d'énergie positive ϵ_{α} , avec la normalisation $\|u_{\alpha}\|^2 - \|v_{\alpha}\|^2 = 1$. À cet ordre, $b_{\alpha}(t) = b_{\alpha}(0)e^{-i\epsilon_{\alpha}t/\hbar}$. Il n'y aurait qu'à injecter la décomposition (20) dans $d\theta/dt$ et à prendre une moyenne temporelle à gros grains pour tuer les termes de battement entre les modes ; $\overline{d\theta/dt}$ contiendrait alors la combinaison linéaire attendue des nombres de quasi-particules bosoniques $n_{B,\alpha} = |b_{\alpha}|^2$. La réalité est plus subtile : à cause de l'interaction entre les quasi-particules, $\overline{b_{\alpha}^{\dagger}}$ n'est pas nul mais d'ordre deux en Λ et Λ^* , si bien que le terme linéaire dans $d\theta/dt$ contribue à la même hauteur que les termes quadratiques. On doit donc calculer $\overline{b_{\alpha}^{\dagger}}$, ce que l'on fait dans l'annexe A, en utilisant en particulier le caractère borné du champ Λ , conséquence du respect de la symétrie $U(1)$ dans le développement (19), puis en appliquant le théorème de Hellmann-Feynman, pour trouver :

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\overline{\theta}}{dt} = \mu_0(N) + \sum_{\alpha} \frac{d\epsilon_{\alpha}}{dN} |b_{\alpha}|^2 + O(\|\Lambda\|^3) \quad (21)$$

Discutons brièvement le spectre ϵ_{α} dans le cas d'un système spatialement homogène, à la limite continue $l \rightarrow 0$ pour une interaction de contact dans l'onde s de longueur de diffusion fixée entre fermions de spin opposé. Pour chaque valeur du vecteur d'onde total $\mathbf{q}$, il se compose d'au plus une énergie discrète $\epsilon_{B,\mathbf{q}}$, et d'un continuum paramétré par deux vecteurs d'onde $(\mathbf{k}_1, \uparrow; \mathbf{k}_2, \downarrow) \mapsto \epsilon_{F,\mathbf{k}_1,\uparrow} + \epsilon_{F,\mathbf{k}_2,\downarrow}$ de somme fixée $(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{q})$, où $\epsilon_{F,\mathbf{k},\sigma}$ est la relation de dispersion BCS. La branche $\mathbf{q} \mapsto \epsilon_{B,\mathbf{q}}$ coïncide bien avec celle de la référence [21], comme nous l'avons vérifié. De départ phononique, elle correspond aux excitations élémentaires bosoniques du gaz de fermions dont nous cherchions la contribution à la dynamique de phase. Elle doit donc être gardée dans (21). En revanche, le continuum correspond à l'excitation de deux quasi-particules fermioniques ; celles-ci ne peuvent en effet être excitées que par paires à partir du fondamental car le hamiltonien $\hat{H}$ contient un nombre pair de facteurs $\hat{\psi}$ et $\hat{\psi}^{\dagger}$, qui détruisent ou créent chacun une quasi-particule. Ces biexcitations ne sont pas physiquement indépendantes,¹¹ et font double emploi avec la contribution de la RPA à $d\hat{\theta}_0/dt$. Il ne faut donc pas les inclure dans (21).

Deux dernières remarques nous séparent de (8). (i) Les champs $\langle \hat{\psi}_1 \hat{\psi}_1^{\dagger} \rangle$ et Φ sont distincts, aussi les phases $\hat{\theta}_0$ et θ ne coïncident-elles pas exactement. Leur valeur moyenne temporelle à gros grains ne diffèrent cependant que par un terme d'ordre $\|\Lambda\|^2$, borné, négligeable aux temps longs, ne contribuant pas au brouillage de phase du condensat de paires.¹² (ii) La phase de notre approche variationnelle est une variable classique, alors que $\hat{\theta}_0$ dans (8) est un opérateur quantique. Ce hiatus est comblé par application au résultat (21) de la procédure de quantification du chapitre 11 de la référence [19], puisque les b_{α} de la branche bosonique y sont remplacés par des opérateurs bosoniques¹³ $\hat{b}_{\alpha}, [\hat{b}_{\alpha}, \hat{b}_{\alpha}^{\dagger}] =$

11. Exciter $\alpha = (\mathbf{k}_1, \uparrow; \mathbf{k}_2, \downarrow)$ et $\alpha' = (\mathbf{k}'_1, \uparrow; \mathbf{k}'_2, \downarrow)$ revient à exciter $\alpha'' = (\mathbf{k}'_1, \uparrow; \mathbf{k}_2, \downarrow)$ et $\alpha''' = (\mathbf{k}_1, \uparrow; \mathbf{k}'_2, \downarrow)$.

12. En exprimant dans $\langle \hat{a}_0 \rangle$ la valeur moyenne du champ de paires en fonction de Φ , on se rend compte pour Λ faible que $\langle \hat{a}_0 \rangle = e^{i\theta} \sqrt{N_0}(1 + O(\|\Lambda\|))$ et donc, étant donné que $\overline{\Lambda^{\dagger}} = O(\|\Lambda\|^2)$, on a $\overline{\hat{\theta}_0} = \overline{\theta} + O(\|\Lambda\|^2)$.

13. Plus précisément, ces opérateurs ne sont bosoniques que pour une faible densité d'excitations. Pour un système homogène spatialement et dans un formalisme qui brise la symétrie $U(1)$ ($\theta = 0$), nous obtenons à partir des équations (11.81c) de [19], généralisées au cas de fermions appariés ($\hat{a}_p, \hat{a}_h^{\dagger}$ sont remplacés par les opérateurs BCS $\hat{b}_{\mathbf{k}\sigma}$ d'annihilation de quasi-particules fermioniques) et restreintes aux images bosoniques faiblement excitées ($\mathbb{B}^{\dagger}$ négligeable) : $\hat{b}_{\mathbf{q}} = \sum_{\mathbf{k}} X_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}} \hat{b}_{-\mathbf{k}\downarrow} \hat{b}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\uparrow} + Y_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}} \hat{b}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger} \hat{b}_{-\mathbf{k}\downarrow}^{\dagger}$. Les coefficients réels $X^{\mathbf{q}}$ et $Y^{\mathbf{q}}$ sont des combinaisons linéaires des coefficients correspondants $u_{\mathbf{q}}$ et $v_{\mathbf{q}}$ dans l'équation (20), et héritent de leur condition de normalisation $\sum_{\mathbf{k}} (X_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}})^2 - (Y_{\mathbf{k}}^{\mathbf{q}})^2 = 1$. Alors, dans un état (16) avec $\theta = 0$, $\hat{\delta}_{\mathbf{q}} \equiv [\hat{b}_{\mathbf{q}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^{\dagger}] - \hat{1}$ a une valeur moyenne et une variance $O(\|\Lambda\|^2/N)$ puisque $\hat{b}_{\mathbf{k}\sigma}|\psi\rangle = O(\|\Lambda\|/N^{1/2})$ si $\|\Lambda\|/N^{1/2} \rightarrow 0$.




FIGURE 1: Quelques considérations expérimentales. (a) Configuration de piégeage proposée pour mesurer $g_1(t)$ par interférométrie de Ramsey : le condensat de paires de fermions est confiné dans le piège principal (à fond plat sur la figure) ; on transfère au plus deux atomes en moyenne (sous forme d'un dimère) dans le piège secondaire (très étroit) par effet tunnel résonnant d'amplitude ajustable par une barrière de hauteur variable ; on crée ainsi une référence de phase avec laquelle on fait interférer le condensat de paires après un temps d'évolution t . (b) Temps de brouillage thermique pour un gaz cohérent de fermions à la limite unitaire dans l'ensemble canonique, en fonction de la température T en unités de la température de Fermi $T_F = \epsilon_F/k_B$. Disques : à partir de l'équation d'état mesurée dans la référence [8]. Ligne tiretée : formule (22) qui utilise l'équation d'état approchée décrite dans le texte.

1. Nous pensons que la validité de l'équation (8), reliant $d\hat{\theta}_0/dt$ à l'opérateur potentiel chimique, et donc du résultat (13), dépasse celle de notre dérivation microscopique variationnelle et inclut le régime d'interaction forte pourvu que les quasi-particules aient une durée de vie beaucoup plus longue que l'inverse de leur fréquence propre, ce qui est le cas à température suffisamment basse. Dans le cas limite où l'on peut négliger la branche d'excitation fermionique et se limiter à la partie phononique de la branche bosonique, c'est bien ce que prédit la variante irrotationnelle de la théorie de l'hydrodynamique quantique de Landau et Khalatnikov [22] (voir l'annexe B).

4. En vue d'une étude expérimentale

Esquissons maintenant un protocole de mise en évidence expérimentale du brouillage thermique d'un condensat de paires. L'idée centrale est, dans les phases de préparation et de mesure, de bosoniser de manière adiabatique réversible [23] les paires de Cooper atomiques sous forme de dimères fortement liés et faiblement interagissants, en ajustant la longueur de diffusion à une faible valeur positive grâce à une résonance de Feshbach magnétique. Ceci permet (i) de produire un échantillon à nombre faiblement fluctuant de dimères, en faisant fondre une phase de Mott préparée par réalisation du modèle de Hubbard bosonique [24], (ii) de créer un couplage tunnel entre le piège principal renfermant les N particules et un piège secondaire très étroit, à travers une barrière de hauteur ajustable [2] (Fig.1a), (iii) de détecter par fluorescence un dimère unique [25] dans ce piège secondaire. Pour mesurer la fonction $g_1(t)$, nous adaptons aux paires de fermions la méthode interférométrique de Ramsey de la référence [26], où sont appliquées deux impulsions de Rabi à un intervalle de temps t . On prépare initialement les paires bosonisées dans le piège principal. La première impulsion est d'angle ϵ suffisamment faible pour transférer en moyenne moins d'un dimère dans le piège secondaire et éviter ainsi le bruit de partition qui masquerait le brouillage thermique. On ajuste ensuite les interactions à la valeur à laquelle on souhaite étudier la dynamique de phase du condensat de paires, et on laisse évoluer pendant le temps t . On rebosonise et on applique une seconde impulsion d'angle ϵ avant de mesurer le nombre n_{sec} de dimères dans le piège secondaire. Alors la valeur moyenne de n_{sec} sur les réalisations présente, en fonction du temps t , des oscillations de demi-pulsation la différence (sur $\hbar$) des potentiels chimiques entre les deux zones de piégeage, et de contraste $|g_1(t)/g_1(0)|$.

5. Quelques résultats explicites sur le gaz unitaire

Pour commencer, donnons une estimation du temps de brouillage pour un gaz unitaire préparé dans l'ensemble canonique, donc avec des fluctuations d'énergie de variance $\text{Var } E = k_B T^2 \partial_T E$. En utilisant l'équation d'état du gaz unitaire non polarisé mesurée dans la référence [8] nous trouvons, pour un système spatialement homogène (dans un

piège à fond plat [27]) les temps de brouillage thermiques t_{br} représentés par des disques sur la figure 1b. Ainsi, à une température $T = 0,12 T_F \approx 0,7 T_c$ où T_c est la température de condensation des paires, on trouve $t_{br} \approx 7N^{1/2}\hbar/\epsilon_F$, ce qui correspond à 20 millisecondes pour une température de Fermi typique $T_F = \epsilon_F/k_B = 1\mu K$ et un nombre d'atomes typique $N = 10^5$. On peut aussi comme dans la référence [28] estimer l'équation d'état du gaz unitaire à partir d'un modèle de gaz parfait de quasi-particules avec des relations de dispersion simples. Pour la branche bosonique, on prend [28] $\epsilon_{B,q} = \hbar cq$ avec c la vitesse du son à $T = 0$, $mc^2 = \frac{2}{3}\xi\epsilon_F$, et ξ le paramètre de Bertsch. Pour la branche fermionique, on prend [29] $\epsilon_{F,k,\sigma} = \Delta + (\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \epsilon_0)^2 / (2f_0)$, où Δ est le *gap* et où ϵ_0 et f_0 donnent la position du minimum et la courbure de la relation de dispersion. En gardant pour chaque branche sa contribution à l'énergie volumique moyenne d'ordre dominant à basse température $\bar{E}_F/V \approx \frac{2m^{3/2}}{\pi^{3/2}\hbar^3}(\epsilon_0 f_0 k_B T)^{1/2} \Delta e^{-\Delta/k_B T}$ et $\bar{E}_B/V \approx \frac{\pi^2}{30}(k_B T)^4/(\hbar c)^3$ comme dans [28], et en utilisant les valeurs expérimentales [8, 30] $\xi = 0,376$, $\Delta = 0,44\epsilon_F$, $\epsilon_0 = 0,85\epsilon_F$ et la valeur théorique [29] $f_0 = 0,846\epsilon_F$, nous trouvons :

$$\frac{N\hbar^2}{(t_{br}\epsilon_F)^2} \approx \left(\frac{\Theta}{0,46}\right)^5 \frac{(1+2r)^2}{(1+r)} \quad (22)$$

où $\Theta = T/T_F$ et où $r \equiv \partial_T \bar{E}_F / \partial_T \bar{E}_B \approx \left(\frac{0,316}{\Theta}\right)^{9/2} e^{-0,44/\Theta}$ mesure l'importance relative des deux branches d'excitation. Cette formule, représentée en tireté sur la figure 1b, donne un équivalent exact de t_{br} quand $\Theta \rightarrow 0$.¹⁴

Aux temps finis¹⁵ $t = O(N^0) \ll t_{br}$, la contribution de D à $g_1(t)$ dans l'équation (13) est *a priori* comparable à celle de t_{br}^{-2} puisque les deux coefficients se comportent comme $1/N$ dans l'ensemble canonique. D peut être calculé à très basse température en ne gardant que la partie phononique du spectre. Dans l'état de l'art, il est prédit par différentes approches que la branche bosonique est convexe aux faibles q dans un gaz unitaire [31, 32, 33],

$$\epsilon_{B,q} \underset{q \rightarrow 0}{=} \hbar cq + \frac{\gamma \hbar^3 q^3}{8m^2 c} + O(q^5) \text{ avec } \gamma > 0 \quad (23)$$

si bien que les phonons interagissent par des processus Landau-Beliaev 2 phonons $\leftrightarrow$ 1 phonon comme dans un gaz de bosons en interaction faible.¹⁶ Nous pouvons alors réutiliser, en l'adaptant,¹⁷ la réduction à basse température de l'expression générale (12) effectuée dans la référence [18]. D'autre part, nous trouvons, par résolution numérique des équations de la RPA de la référence [21], que $\gamma \approx 0,1$, en accord avec [33, 34], si bien que

$$\frac{\hbar ND}{\epsilon_F} \underset{\Theta \rightarrow 0}{\sim} C \Theta^4 \quad \text{avec} \quad C \approx 0,4 \quad (24)$$

Ceci achève notre description du brouillage thermique d'un gaz de fermions à la limite unitaire et à basse température.

6. Conclusion

Nous avons présenté la première théorie microscopique du brouillage thermique de la phase d'un condensat de paires de fermions (13), et mis en évidence un brouillage balistique et une diffusion de phase sous-dominante. Le

14. Le bon accord avec les données expérimentales est à relativiser car si l'on traite les deux branches du modèle à tous les ordres en $k_B T$, on obtient un décalage vers le haut de $t_{br}\epsilon_F/(\hbar N^{1/2})$ à peu près constant et égal à 5 sur l'intervalle de température de la figure 1b.

15. Les temps que l'on considère sont néanmoins contraints par l'inégalité $t > \tau_c$ (voir la note 1) : pour un gaz unitaire $\tau_c \approx (0,149/\Theta)^5$ quand $\Theta \rightarrow 0$, d'après la note 17.

16. Dans le cas concave, les processus dominants sont les diffusions 2 phonons $\leftrightarrow$ 2 phonons comme dans la référence [22]

17. L'astuce universalisante à basse température est d'utiliser, quel que soit le système physique, $mc/\hbar$ comme unité de vecteur d'onde et mc^2 comme unité d'énergie. Partons alors du coefficient de diffusion de la phase et du temps de corrélation des quasi-particules pour des bosons en interaction faible [18] : $\hbar ND/(mc^2) \sim c_1(k_B T/mc^2)^4$ et $mc^2\tau_c/\hbar \sim c_3\rho[\hbar/(\sqrt{2}mc)]^3(mc^2/k_B T)^5$, où $c_1 \approx 0,3036$ et $c_3 \approx 0,05472$, et recensons tous les facteurs correctifs faisant passer du gaz de bosons en interaction faible au gaz unitaire de fermions, compte tenu du fait que D est une fonction quadratique de $P\vec{A}$ et linéaire de M^{-1} , voir l'équation (12) : (i) dans le cas d'un condensat de paires, il y a un facteur deux dans les coefficients $\vec{A}$ de $-\partial\hat{\theta}_0/\partial t$, donc un facteur quatre sur D , (ii) l'équation d'état passe de $\mu_0(\rho) \propto \rho$ à $\mu_0(\rho) \propto \rho^{2/3}$, où ρ est la densité, donc $(N/c)dc/dN$ dans $\vec{A}$ passe de $1/2$ à $1/3$, d'où un facteur $2/3$ sur $\vec{A}$ et un facteur $4/9$ sur D , (iii) $P\vec{A}$, nul pour une branche d'excitation bosonique linéaire en q puisqu'alors $\vec{A} \propto \vec{q}$, est proportionnel à basse température au paramètre de courbure sans dimension γ , qui valait un dans [18], d'où un facteur γ^2 dans D , (iv) d'après l'hydrodynamique quantique [22], les amplitudes adimensionnées de couplage Beliaev-Landau entre les quasi-particules, à des valeurs fixées des vecteurs d'onde adimensionnés, dépendent du système seulement via un facteur global $1 + \Lambda$, où $\Lambda = \rho\mu_0''(\rho)/[3\mu_0'(\rho)]$ passe de 0 à $\Lambda_u = -1/9$, d'où un facteur $(1 + \Lambda_u)^{-2}$ sur la matrice M^{-1} donc sur D et sur le temps de corrélation τ_c induit par les collisions entre les quasi-particules. Alors, pour le gaz unitaire, $\hbar ND/(mc^2) \sim c_1[(4\gamma/3)^2/(1 + \Lambda_u)^2](k_B T/mc^2)^4$ et $mc^2\tau_c/\hbar \sim c_3(1 + \Lambda_u)^{-2}\rho[\hbar/(\sqrt{2}mc)]^3(mc^2/k_B T)^5$.

temps de brouillage dépend de la variance de l'énergie totale du gaz, ainsi que de la dérivée du potentiel chimique microcanonique du gaz par rapport à l'énergie. Le coefficient de diffusion de la phase peut être déduit d'équations cinétiques sur les nombres de quasi-particules. Pour établir ces résultats, nous avons utilisé de façon centrale le fait que la vitesse de variation de la phase du condensat de paires est reliée à l'opérateur potentiel chimique du gaz par l'équation (8), dont nous avons donné une dérivation microscopique incluant les deux branches d'excitation du gaz, bosonique et fermionique. Nous avons enfin proposé un protocole expérimental de mesure de ce temps, que nous avons estimé être de l'ordre de la dizaine de millisecondes pour un gaz cohérent de fermions préparé à la limite unitaire dans l'ensemble canonique.

Remerciements

Ce travail a bénéficié d'un financement européen via le projet QIBEC sous le numéro de contrat 284 584.

Annexe A. Compléments sur le calcul variationnel avec un état cohérent de paires

Dans cette annexe nous démontrons l'équation (21) portant sur la moyenne temporelle de θ grâce à un modèle microscopique fondé sur l'Ansatz (16), état cohérent de paires en mouvement. Il est commode dans un premier temps de traiter la variable réelle n et le champ complexe Λ dans (19) comme des variables indépendantes, c'est-à-dire de ne pas fixer $\|\Phi\|$. Pour inclure les interactions entre les quasi-particules, il faut aller jusqu'à l'ordre trois en Λ et Λ^* comme suit :

$$\mathcal{H}(\Phi, \Phi^*) = \mathcal{T}_0[n, \phi_0(N)] + \sum_{j=1}^3 \mathcal{T}_j[n, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^4) \quad (25)$$

Le tenseur $\mathcal{T}_j$ est de rang j , c'est-à-dire que $\mathcal{T}_j(\Lambda, \Lambda^*)$ est d'ordre exactement j en Λ et Λ^* ; il peut s'exprimer en termes de la différentielle j -ième de $\mathcal{H}$ prise en $(\Phi, \Phi^*) = (n^{1/2}\phi_0, n^{1/2}\phi_0)$ restreinte au sous-espace orthogonal à $(\phi_0, 0)$ et $(0, \phi_0)$, où l'on a pris ϕ_0 réelle, et il ne dépend pas de la phase θ du fait de la symétrie $U(1)$. À nombre total de particules fixé, l'énergie ne varie pas au premier ordre autour du minimiseur si bien que $\mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)] = 0$. Cette innocente équation n'est autre que la célèbre équation du *gap* lorsque le système est spatialement homogène. De plus, on vérifie que $\partial_n \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] = 2\mu_0(N)$ où $\mu_0(N) = dE_0(N)/dN$ est le potentiel chimique du gaz à température nulle, $E_0(N) = \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)]$ étant l'énergie de l'état fondamental.

Les variables phase et module au carré de l'amplitude du champ Φ dans le mode ϕ_0 sont canoniquement conjuguées, si bien que $-\hbar d\theta/dt = \partial_n \mathcal{H}(\Phi, \Phi^*)$. Une fois effectuée cette dérivée dans (25) à Λ et Λ^* fixés, on peut fixer la norme de Φ à $(N/2)^{1/2}$ (c'est-à-dire le nombre total de particules à N) et éliminer n grâce à la relation $n = \|\Phi\|^2 - \|\Lambda\|^2$; le champ Λ reste alors la seule variable dynamique du problème. L'expression est utile seulement jusqu'à l'ordre deux en Λ, Λ^* :

$$-\hbar \frac{d\theta}{dt} = \partial_n \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] - \|\Lambda\|^2 \partial_n^2 \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] + \sum_{j=1}^2 \partial_n \mathcal{T}_j[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^3) \quad (26)$$

Le hamiltonien régissant l'évolution de Λ à nombre de particules fixé s'obtient en remplaçant n par $N/2 - \|\Lambda\|^2$ dans (25) et en développant jusqu'à l'ordre trois en Λ, Λ^* :

$$\mathcal{H}_N(\Lambda, \Lambda^*) = E_0(N) + \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) + \mathcal{T}_3[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) - \|\Lambda\|^2 \partial_n \mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^4) \quad (27)$$

où la forme quadratique $\check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*)$ est obtenue en soustrayant $2\mu_0(N)\|\Lambda\|^2$ à $\mathcal{T}_2[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*)$. Pour calculer la moyenne temporelle à gros grains de $\partial_n \mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*)$, c'est-à-dire du terme linéaire en Λ, Λ^* posant problème dans $d\theta/dt$ (voir le corps de l'article), il est astucieux d'écrire alors directement la dérivée temporelle de la partie imaginaire du champ Λ projetée sur la fonction $(N/2)^{1/2} d\phi_0/dN$,

$$Y \equiv \frac{l^6}{2i} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \left(\frac{N}{2} \right)^{1/2} \frac{d\phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{dN} (\Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - \Lambda^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}')) \quad (28)$$

Comme $i\hbar\partial_t\Lambda = l^{-6}\partial_{\Lambda^*}\mathcal{H}_N(\Lambda, \Lambda^*)$, il vient

$$-2\hbar\frac{dY}{dt} = \mathcal{D} \cdot \mathcal{H}_N(\Lambda, \Lambda^*) = \mathcal{D} \cdot \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) + \mathcal{D} \cdot \mathcal{H}_N^{\text{cub}}(\Lambda, \Lambda^*) + O(\|\Lambda\|^3) \quad (29)$$

où $\mathcal{H}_N^{\text{cub}}$ est la partie de $\mathcal{H}_N$ d'ordre trois en Λ, Λ^* . On a introduit l'opérateur différentiel

$$\mathcal{D} = \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \left(\frac{N}{2}\right)^{1/2} \frac{d\phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{dN} (\partial_{\Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}')} + \partial_{\Lambda^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}) \quad (30)$$

Nous allons maintenant mettre à profit en cascade deux relations vérifiées pour tout Λ orthogonal à $\phi_0(N)$:

$$2\mathcal{D} \cdot \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) = -\partial_n \mathcal{T}_1[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) \quad (31)$$

$$2\mathcal{D} \cdot \mathcal{H}_N^{\text{cub}}(\Lambda, \Lambda^*) = 2\frac{d}{dN} \check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) - \partial_n \mathcal{T}_2[N/2, \phi_0(N)](\Lambda, \Lambda^*) + \|\Lambda\|^2 \partial_n^2 \mathcal{T}_0[N/2, \phi_0(N)] \quad (32)$$

On établit ces relations en considérant formellement un champ Φ' à $N + \delta N$ particules et en obtenant de deux façons différentes l'approximation quadratique en Λ' et Λ'^* de $\mathcal{H}_{N+\delta N}(\Lambda', \Lambda'^*)$ où Λ' est à une phase près comme dans (19) (écrite pour $N + \delta N$ particules) la composante de Φ' orthogonale à $\phi_0(N + \delta N)$. D'une part, on remplace simplement N par $N + \delta N$ et Λ par Λ' dans (27), puis on développe au premier ordre en δN , ce qui fait apparaître $d\check{\mathcal{T}}_2/dN[N]$. D'autre part, on applique à $\mathcal{H}(\Phi', \Phi'^*)$ le développement (25) autour de $\Phi_0(N)$ sachant qu'au premier ordre en δN , la composante de Φ' orthogonale à $\phi_0(N)$ contient, en plus de celle $\Lambda'_\perp$ de Λ' , une contribution venant de $d\phi_0/dN$:

$$\Lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta N \left(\frac{N}{2}\right)^{1/2} \frac{d\phi_0}{dN}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \Lambda'_\perp(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + O(\delta N^2, \|\Lambda'\|^3, \delta N \|\Lambda'\|^2) \quad (33)$$

C'est ce décalage infinitésimal proportionnel à δN dans la direction de $d\phi_0/dN$ qui fait apparaître l'opérateur $\mathcal{D}$. Les équations (31) et (32) résultent de l'identification aux ordres un et deux en Λ' et Λ'^* des deux expressions de $\mathcal{H}_{N+\delta N}(\Lambda', \Lambda'^*)$ obtenues.

Le plus gros du travail a été accompli. Il reste à combiner les équations (26), (29), (31), et (32), ou plus précisément leur moyenne temporelle à gros grains (sur une échelle de temps longue devant la période d'oscillation des amplitudes modales b_α mais courte devant le temps d'évolution des nombres de quasi-particules $|b_\alpha|^2$) pour obtenir

$$-\frac{\hbar}{2} \frac{d\theta}{dt} = \mu_0(N) + \overline{\frac{d\check{\mathcal{T}}_2}{dN}[N](\Lambda, \Lambda^*)} + O(\|\Lambda\|^3) \quad (34)$$

où nous avons utilisé de façon cruciale la nullité de $\overline{d\Lambda/dt}$ (et donc de $\overline{dY/dt}$) pour le champ Λ , dont l'excursion est bornée. La forme quadratique $\check{\mathcal{T}}_2[N]$ est représentée par la matrice $\eta\mathcal{L}[N]$ avec $\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, soit, en notation par blocs et avec le produit scalaire hermitien $\langle, \rangle$ dont découle la norme $\|\cdot\|$:

$$\check{\mathcal{T}}_2[N](\Lambda, \Lambda^*) = \frac{1}{2} \left\langle \begin{pmatrix} \Lambda & \Lambda^* \end{pmatrix}, \eta\mathcal{L}[N] \begin{pmatrix} \Lambda \\ \Lambda^* \end{pmatrix} \right\rangle \quad (35)$$

Il reste à injecter la décomposition modale (20) dans l'équation (35) préalablement dérivée par rapport à N , les ϵ_α et (u_α, v_α) , $-\epsilon_\alpha$ et (v_α^*, u_α^*) étant les valeurs propres et vecteurs propres de $\mathcal{L}$. La valeur moyenne à gros grains $\overline{\cdot}$ se charge d'éliminer les termes croisés et le théorème de Hellmann-Feynman assure que¹⁸ $\langle (u_\alpha, -v_\alpha), \frac{d\mathcal{L}[N]}{dN} \begin{pmatrix} u_\alpha \\ v_\alpha \end{pmatrix} \rangle = d\epsilon_\alpha/dN$, et permet ainsi de conclure sur l'équation (21).

18. $(u_\alpha, -v_\alpha)$ est le vecteur dual de (u_α, v_α) car $(\eta\mathcal{L})^\dagger = \eta\mathcal{L}$.

Annexe B. Hydrodynamique quantique irrotationnelle

Dans cette annexe nous donnons une démonstration supplémentaire de l'équation (8) à partir de l'hydrodynamique quantique. Bien que cette démonstration ne soit pas microscopique, à l'inverse de celle que nous avons donnée dans le corps de l'article et dans l'annexe A, et bien qu'elle néglige les degrés de liberté fermioniques internes et se contente d'une description aux grandes échelles spatiales des paires de fermions, par un champ bosonique donc, elle présente l'avantage de reposer uniquement sur l'équation d'état et d'être ainsi valide dans tous les régimes d'interaction.

En 1949, pour calculer la viscosité de l'hélium superfluide à basse température, Landau et Khalatnikov ont développé la théorie de l'hydrodynamique quantique [22], qui permet de déterminer, de manière exacte à l'ordre dominant en T , les effets d'une température non nulle sur les observables d'un fluide quantique, du moins sur celles dépendant seulement des faibles échelles d'énergie et des grandes échelles de longueur. De façon remarquable, le seul ingrédient spécifique est l'équation d'état du fluide à température nulle, c'est-à-dire ici la densité volumique d'énergie $e_0(\rho)$ de l'état fondamental du système spatialement homogène de densité ρ .

Afin d'obtenir la dérivée temporelle de l'opérateur phase du condensat de paires de fermions, nous apportons deux raffinements à la théorie, une régularisation des divergences ultraviolettes et une spécialisation au cas irrotationnel.

D'une part, nous résolvons les problèmes de divergence du niveau d'énergie fondamental du hamiltonien de Landau-Khalatnikov, dus à l'énergie quantique de point zéro des modes propres du système, en discrétisant l'espace en un réseau cubique de pas l , sous-multiple de la longueur L de la boîte de quantification, beaucoup plus petit que la longueur d'onde typique $2\pi/q_{\text{th}}$ des excitations du fluide peuplées thermiquement, mais beaucoup plus grand que la distance moyenne $\rho^{-1/3}$ entre particules,

$$\rho^{-1/3} \ll l \ll q_{\text{th}}^{-1} \quad (36)$$

ce qui est réalisable à suffisamment basse température; ce maillage souscrit au régime de validité de l'hydrodynamique, celui d'une description spatiale à gros grains, et fournit une coupure naturelle ultraviolette dans l'espace des vecteurs d'onde $\mathbf{q}$, en les restreignant à la première zone de Brillouin¹⁹ $\mathcal{D} = [-\pi/l, \pi/l]^3$. Dans le hamiltonien, il faut alors remplacer les opérateurs différentiels (gradient, divergence, laplacien) par leurs équivalents discrets, comme il sera implicitement fait plus bas, et il faut utiliser la densité volumique d'énergie *nue* $e_{0,0}(\rho)$, fonction du pas du réseau l ; suivant les idées de la renormalisation, l'énergie quantique de point zéro des modes, formellement divergente lorsque $l \rightarrow 0$, s'ajoute alors à $e_{0,0}(\rho)$ pour reconstruire précisément la densité volumique d'énergie *effective* ou *vraie* $e_0(\rho)$, indépendante de l , et qui est celle mesurée expérimentalement.

D'autre part, nous spécialisons la théorie au cas d'un opérateur champ de vitesse $\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{r}, t)$ irrotationnel, qu'on peut donc écrire comme le gradient d'un opérateur champ de phase $\hat{\phi}(\mathbf{r}, t)$, canoniquement conjugué à l'opérateur champ de densité $\hat{\rho}(\mathbf{r}, t)$:

$$\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hbar}{m} \text{grad } \hat{\phi}(\mathbf{r}, t) \text{ avec } [\hat{\rho}(\mathbf{r}, t), \hat{\phi}(\mathbf{r}', t)] = i \frac{\delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'}}{l^3} \quad (37)$$

Ceci revient à négliger la composante transverse du champ $\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{r}, t)$, comme l'a fait la référence [22] pour déterminer l'interaction entre phonons et avancer dans le calcul de la viscosité. Dans le cas particulier invariant d'échelle du gaz de fermions unitaire, une justification en est donnée dans la référence [35] dans le cadre de la théorie effective des champs. Notons en passant que la densité de quasi-particules fermioniques, exponentiellement petite en $1/T$, est elle directement omise par la théorie hydrodynamique.

La suite est assez classique. On part des équations du mouvement des champs en représentation de Heisenberg, respectivement l'équation de continuité quantique et l'équation d'Euler quantique sur le potentiel (dont le gradient donne l'équation d'Euler quantique sur la vitesse) :

$$\partial_t \hat{\rho} + \text{div} \left[\frac{1}{2} \{\hat{\rho}, \hat{\mathbf{v}}\} \right] = 0 \quad (38)$$

$$\hbar \partial_t \hat{\phi} = -\frac{1}{2} m \hat{\mathbf{v}}^2 - \mu_{0,0}(\hat{\rho}) \quad (39)$$

19. Il faut aussi que les excitations élémentaires du système restent phononiques sur tout le domaine $\mathcal{D}$. Ceci impose $\hbar c/l < \Delta$ donc $mcl/\hbar > mc^2/\Delta \gg 1$ dans la limite de BCS, et seulement $mcl/\hbar > 1$ ailleurs, où c est la vitesse du son et Δ le *gap* à $T = 0$. La condition nécessaire $mcl/\hbar > 1$ est plus faible que celle déjà invoquée, $\rho^{1/3}l \gg 1$, dans le régime d'interaction forte ou dans la limite de BCS, puisque c y est d'ordre la vitesse de Fermi. Elle est plus contraignante dans la limite dite de CBE, où les paires de fermions, assimilables à des bosons, forment un condensat en interaction faible.

où $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$ est l'anticommutateur de deux opérateurs et

$$\mu_{0,0}(\rho) = \frac{d}{d\rho} e_{0,0}(\rho) = e'_{0,0}(\rho) \quad (40)$$

est le potentiel chimique nu de l'état fondamental à la densité ρ . Ces équations dérivent du hamiltonien

$$\hat{H}_{\text{hydro}} = l^3 \sum_{\mathbf{r}} \left[\frac{1}{2} m \hat{\mathbf{v}} \cdot \hat{\rho} \hat{\mathbf{v}} + e_{0,0}(\hat{\rho}) \right] \quad (41)$$

Les fluctuations spatiales de densité et de phase sont faibles, parce que $\rho^{1/3}l$ est assez grand si elles sont quantiques, parce que $q_{\text{th}}l$ est de plus assez petit si elles sont thermiques.²⁰ On peut donc, comme dans [22], linéariser les équations du mouvement autour de la solution spatialement uniforme :

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}, t) = \hat{\rho}_0 + \delta\hat{\rho}(\mathbf{r}, t) \quad (42)$$

$$\hat{\phi}(\mathbf{r}, t) = \hat{\phi}_0(t) + \delta\hat{\phi}(\mathbf{r}, t) \quad (43)$$

L'opérateur $\hat{\rho}_0$ vaut simplement $\hat{N}/L^3$, où $\hat{N}$ est l'opérateur nombre total de particules ; c'est une constante du mouvement. L'opérateur $\hat{\phi}_0$ est l'opérateur phase du condensat, ici

$$\hat{\phi}_0 = \hat{\theta}_0/2 \quad (44)$$

puisque l'opérateur phase $\hat{\theta}_0$ de l'équation (2) prend les paires pour objets élémentaires, alors que les équations (38,39) privilégient les particules fermioniques. Les fluctuations spatiales $\delta\hat{\rho}$ et $\delta\hat{\phi}$, d'intégrale (discrète) nulle sur tout l'espace, se développent seulement sur les ondes planes de vecteur d'onde $\mathbf{q}$ non nul, et commutent avec $\hat{\rho}_0$. Après résolution des équations linéarisées sur $\delta\hat{\rho}$ et $\delta\hat{\phi}$, on dispose de l'habituel développement sur les modes propres :

$$\delta\hat{\rho}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hat{\rho}_0^{1/2}}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{q} \in \frac{2\pi}{L} \mathbb{Z}^3 \cap \mathcal{D}} \left(\frac{\hbar \mathbf{q}}{2m\hat{c}_{0,0}} \right)^{1/2} (\hat{B}_{\mathbf{q}} + \hat{B}_{-\mathbf{q}}^\dagger) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \quad (45)$$

$$\delta\hat{\phi}(\mathbf{r}, t) = \frac{-i}{\hat{\rho}_0^{1/2} L^{3/2}} \sum_{\mathbf{q} \in \frac{2\pi}{L} \mathbb{Z}^3 \cap \mathcal{D}} \left(\frac{m\hat{c}_{0,0}}{2\hbar \mathbf{q}} \right)^{1/2} (\hat{B}_{\mathbf{q}} - \hat{B}_{-\mathbf{q}}^\dagger) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \quad (46)$$

où les opérateurs de création $\hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger$ et d'annihilation $\hat{B}_{\mathbf{q}}$ d'un phonon de vecteur d'onde $\mathbf{q}$ et d'énergie $\hbar \mathbf{q} \hat{c}_{0,0}$ obéissent aux relations de commutation bosoniques, par exemple $[\hat{B}_{\mathbf{q}}, \hat{B}_{\mathbf{q}'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'}$, et où l'on a introduit l'opérateur vitesse du son nue à température nulle

$$\hat{c}_{0,0} \equiv \left(\frac{\hat{\rho}_0 \mu'_{0,0}(\hat{\rho}_0)}{m} \right)^{1/2} \quad (47)$$

Il reste alors à développer le second membre de (39) jusqu'à l'ordre deux inclus en $\delta\hat{\rho}$ et $\delta\hat{\phi}$, à en extraire la composante de Fourier de vecteur d'onde nul, à effectuer une moyenne temporelle à gros grains pour supprimer les termes croisés oscillants $\hat{B}_{\mathbf{q}} \hat{B}_{-\mathbf{q}}$ et $\hat{B}_{-\mathbf{q}}^\dagger \hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger$, puis à reconnaître l'identité

$$\frac{d}{d\rho} [\rho \mu'_{0,0}(\rho)]^{1/2} = \frac{\mu'_{0,0}(\rho) + \rho \mu''_{0,0}(\rho)}{2[\rho \mu'_{0,0}(\rho)]^{1/2}} \quad (48)$$

20. On vérifie d'abord que les fluctuations de densité sur un même site sont faibles en valeur relative, en utilisant (45). À $T = 0$, $\langle \delta\hat{\rho}^2 \rangle / \rho^2 \approx \frac{\hbar}{mcl} \frac{1}{\rho l^3} \ll 1$, compte tenu de (36) et de la condition nécessaire $mcl/\hbar > 1$ établie dans la note 19. À $T > 0$ s'ajoute la contribution thermique $\approx \frac{\hbar}{mcl} \frac{(q_{\text{th}} l)^4}{\rho l^3}$, qui est de même $\ll 1$. On vérifie ensuite que les fluctuations de phase entre deux sites voisins sont faibles en valeur absolue. Pour cela, on constate d'abord, en utilisant (46), que $l^2 \langle (\mathbf{grad} \delta\hat{\phi})^2 \rangle = (mcl/\hbar)^2 \langle \delta\hat{\rho}^2 \rangle / \rho^2$. Il reste ensuite à utiliser la propriété $mc/(\hbar \rho^{1/3}) = O(1)$ qui vaut dans toute la zone de raccordement entre les limites de CBE et de BCS, ainsi que nos estimations précédentes de $\langle \delta\hat{\rho}^2 \rangle / \rho^2$, pour conclure.

pour obtenir

$$\overline{\hbar \frac{d}{dt} \hat{\phi}_0} = -\mu_{0,0}(\hat{\rho}_0) - \sum_{\mathbf{q} \in \frac{2\pi}{L} \mathbb{Z}^{3*} \cap \mathcal{D}} \left(\hbar q \frac{d}{d\hat{N}} \hat{c}_{0,0} \right) \left(\hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{B}_{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \right) \quad (49)$$

À cet ordre du développement en les fluctuations spatiales, on peut regrouper dans (49) la contribution de point zéro des modes (le terme $1/2$ entre parenthèses) avec le potentiel chimique nu $\mu_{0,0}(\hat{\rho}_0)$ pour former le potentiel chimique vrai $\mu_0(\hat{\rho}_0)$ du fluide à température nulle, et identifier $\hat{c}_{0,0}$ dans le préfacteur des opérateurs nombres de phonons $\hat{B}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{B}_{\mathbf{q}}$ avec la vitesse du son vraie à température nulle, $\hat{c}_0 \equiv [\hat{\rho}_0 \mu'_0(\hat{\rho}_0)/m]^{1/2}$. On obtient alors la limite phononique (de basse température) de la relation (8), et ceci sans hypothèse sur la force (ou la faiblesse) des interactions.

Références

- [1] M. Greiner, O. Mandel, T. W. Hänsch, I. Bloch, *Nature* 419 (2002) 51.
- [2] J. Estève, C. Gross, A. Weller, S. Giovanazzi, M. K. Oberthaler, *Nature* 455 (2008) 1216.
- [3] M. F. Riedel, P. Böhi, Yun Li, T. W. Hänsch, A. Sinatra, P. Treutlein, *Nature* 464 (2010) 1170.
- [4] G.-B. Jo, Y. Shin, S. Will, T. A. Pasquini, M. Saba, W. Ketterle, D. E. Pritchard, M. Vengalattore, M. Prentiss, *Phys. Rev. Lett.* 98 (2007) 030407.
- [5] M. Egorov, R. P. Anderson, V. Ivannikov, B. Opanchuk, P. Drummond, B. V. Hall, A. I. Sidorov, *Phys. Rev. A* 84 (2011) 021605.
- [6] T. Berrada, S. van Frank, R. Bücker, T. Schumm, J.-F. Schaff, J. Schmiedmayer, *Nature Communications* 4 (2013) 2077.
- [7] S. Nascimbène, N. Navon, K. J. Jiang, F. Chevy, C. Salomon, *Nature* 463 (2010) 1057.
- [8] M. J. H. Ku, A. T. Sommer, L. W. Cheuk, M. W. Zwierlein, *Science* 335 (2012) 563.
- [9] C. Kohstall, S. Riedl, E. R. Sánchez Guajardo, L. A. Sidorenkov, J. Hecker Denschlag, R. Grimm, *New Journal of Physics* 13 (2011) 065027.
- [10] I. Carusotto, Y. Castin, *Phys. Rev. Lett.* 94 (2005) 223202.
- [11] H. Kurkjian, Y. Castin, A. Sinatra, *Phys. Rev. A* 88 (2013) 063623.
- [12] A. Sinatra, Y. Castin, E. Witkowska, *Phys. Rev. A* 75 (2007) 033616.
- [13] A. B. Kuklov, J. L. Birman, *Phys. Rev. A* 63 (2000) 013609.
- [14] P. Anderson, *Phys. Rev.* 112 (1958) 1900.
- [15] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg, *Processus d'interaction entre photons et atomes*, InterEditions et Éditions du CNRS, Paris (1988).
- [16] A. J. Leggett, *Quantum Liquids*, Oxford University Press, Oxford (2006).
- [17] M. Rigol, V. Dunjko, M. Olshanii, *Nature* 452 (2008) 854.
- [18] A. Sinatra, Y. Castin, E. Witkowska, *Phys. Rev. A* 80 (2009) 033614.
- [19] J.-P. Blaizot, G. Ripka, *Quantum Theory of Finite Systems*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts (1985).
- [20] Y. Castin, R. Dum, *Phys. Rev. A* 57 (1998) 3008.
- [21] R. Combescot, M. Yu. Kagan, S. Stringari, *Phys. Rev. A* 74 (2006) 042717.
- [22] L. Landau, I. Khalatnikov, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* 19 (1949) 637.
- [23] M. Bartenstein, A. Altmeyer, S. Riedl, S. Jochim, C. Chin, J. Hecker Denschlag, R. Grimm, *Phys. Rev. Lett.* 92 (2004) 120401.
- [24] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, I. Bloch, *Nature* 415 (2002) 39.
- [25] W. S. Bakr, J. I. Gillen, A. Peng, S. Fölling, M. Greiner, *Nature* 462 (2009) 74.
- [26] Y. Castin, A. Sinatra, chapitre « Spatial and Temporal Coherence of a Bose-condensed Gas » dans *Physics of Quantum fluids : New Trends and Hot Topics in Atomic and Polariton Condensates*, A. Bramati, M. Modugno (éditeurs), Springer, Berlin (2013).
- [27] A. L. Gaunt, T. F. Schmidutz, I. Gotlibovych, R. P. Smith, Z. Hadzibabic, *Phys. Rev. Lett.* 110 (2013) 200406.
- [28] A. Bulgac, J. E. Drut, P. Magierski, *Phys. Rev. Lett.* 96 (2006) 090404.
- [29] Y. Nishida, D. T. Son, *Phys. Rev. Lett.* 97 (2006) 050403.
- [30] A. Schirotzek, Yong-il Shin, C. H. Schunck, W. Ketterle, *Phys. Rev. Lett.* 101 (2008) 140403.
- [31] Y. Castin, I. Ferrier-Barbut, C. Salomon, C. R. *Physique* 16 (2015) 241.
- [32] G. Bighin, L. Salasnich, P. A. Marchetti, F. Toigo, *Phys. Rev. A* 92 (2015) 023638.
- [33] S. N. Klimin, J. Tempere, Jeroen P. A. Devreese, J. Low. Temp. Phys. 165 (2011) 261.
- [34] H. Kurkjian, Y. Castin, A. Sinatra, *Phys. Rev. A* 93 (2016) 013623.
- [35] D. T. Son, M. Wingate, *Ann. Physics* 321 (2006) 197.